

Fiche d'information sur les médicaments

SUNItinib

(su-ni-ti-nib)

Ce document fournit des renseignements généraux à propos de votre médicament. Il ne remplace pas les conseils de votre équipe de spécialistes des soins de santé. Vous devez toujours discuter de votre traitement avec votre spécialiste des soins de santé et consulter la notice d'accompagnement du produit pour plus de détails.

Autre nom(s): Sutent^{MD}**Présentation:** capsule dans plusieurs concentrations et couleurs

Pourquoi ce médicament est-il utilisé?

- Pour le traitement de certaines formes de cancer du rein, ou pour le traitement des tumeurs du stroma gastro-intestinal (forme rare de cancer qui atteint généralement l'estomac ou les intestins), et d'une forme rare de cancer du pancréas

Qu'est-ce que je dois faire avant d'avoir ce médicament?

- Parlez-en à votre équipe de soins de santé si vous avez des troubles de santé importants, plus particulièrement si vous avez ou avez déjà eu :
 - ◊ des troubles du foie, des reins, de la thyroïde, des surrénales,
 - ◊ des troubles cardiaques (y compris un accident vasculaire cérébral ou des épisodes d'évanouissement),
 - ◊ des antécédents familiaux de troubles cardiaques,
 - ◊ une hypertension artérielle,
 - ◊ des problèmes de saignement,
 - ◊ une chirurgie récente ou à venir, une blessure ou une infection grave,
 - ◊ des allergies.

N'oubliez pas :

- Informez votre équipe de soins de santé de tout autre médicament que vous prenez.
- Continuez de prendre les autres médicaments qui vous ont été prescrits, sauf indication contraire de votre équipe de soins de santé.

Vous pouvez consulter la version la plus récente de cette fiche à la page <https://www.cancercareontario.ca/fr/drugs>

Vous trouverez de plus amples renseignements sur le traitement des symptômes à la page <https://www.cancercareontario.ca/fr/symptomes>

Ressources créées par l'équipe chargée du formulaire des médicaments de CCO, avec l'avis de l'équipe de formation des patients et des conseillers des patients et des familles.
septembre 2023

Comment ce médicament affecte-il les relations sexuelles, la grossesse et l'allaitement?

Parlez à votre équipe de soins de santé des sujets suivants :

- Comment ce médicament peut affecter votre santé sexuelle.
- Comment ce médicament peut affecter votre capacité à avoir un enfant, si cela s'applique à vous.

Ce médicament peut être nocif pour un fœtus. Parlez-en à votre équipe de soins de santé si vous ou votre partenaire êtes enceinte, devenez enceinte pendant le traitement, ou si vous allaitez.

- S'il y a **le moindre** risque de grossesse, vous et votre partenaire devez utiliser **2 méthodes efficaces de contraception** simultanément jusqu'à **6 mois** après votre dernière dose (recommandation générale). Discutez avec votre équipe de soins de santé des choix de contraception qui vous conviennent.
- N'allaitiez pas pendant ce traitement.

Comment ce médicament est-il donné?

- Ce médicament est généralement pris par voie orale une fois par jour. Pour certains patients, il peut être pris certains jours du cycle de traitement. Demandez à votre équipe de soins de santé comment et quand vous devez prendre votre médicament.
- Avalez-le en entier avec un verre d'eau, avec ou sans nourriture.
- N'écrasez pas, ne mâchez pas et n'ouvrez pas les capsules.
- Si vous vomissez après avoir pris votre médicament, demandez ce qu'il faut faire à votre équipe de soins de santé.
- Si vous oubliez une dose, ne prenez pas de double dose du médicament. Suivez les instructions que vous avez reçues ou parlez à votre équipe de soins de santé si vous ne savez pas quoi faire. Si vous ne pouvez pas parler à votre équipe de soins de santé, prenez la dose suivante à l'heure prévue.
- Si vous prenez une surdose de votre médicament de traitement du cancer par accident, ou si vous pensez qu'un enfant ou un animal de compagnie pourrait avoir avalé votre médicament, vous devez appeler le Centre antipoison de l'Ontario immédiatement au : 1 800 268-9017.

Qu'est-ce que je dois savoir de plus lorsque je prends ce médicament?

Ce médicament interagit-il avec d'autres médicaments ou produits de santé naturels?

- Ce médicament peut interagir avec d'autres médicaments, vitamines, aliments et produits de santé naturels. Les interactions peuvent empêcher le traitement de fonctionner ou provoquer de graves effets secondaires.
- Parlez à votre équipe de soins de santé de tous vos :
 - médicaments sur ordonnance ou en vente libre (sans ordonnance) et toute autre drogue, comme le cannabis (médical ou récréatif)
 - produits de santé naturelle comme les vitamines, les tisanes, les traitements d'homéopathie et autres suppléments
- Consultez votre équipe de soins de santé avant de commencer ou d'arrêter tout traitement.
- Si vous prenez des médicaments contre les convulsions (comme la phénytoïne), votre équipe de soins de santé pourrait surveiller étroitement vos taux sanguins et modifier votre dose.

Que faire si je me sens mal, si j'ai des douleurs, des maux de tête ou de la fièvre?

- Prenez toujours votre température pour voir si vous avez de la fièvre avant de prendre tout médicament contre la fièvre ou la douleur (comme l'acétaminophène [Tylenol^{MD}] ou l'ibuprofène [Advil^{MD}]).
 - La fièvre peut être un signe d'infection nécessitant un traitement immédiat.
 - Si vous prenez ces médicaments avant de vérifier si vous avez de la fièvre, ils pourraient faire baisser votre température et vous pourriez ne pas savoir si vous avez une infection.

Comment vérifier si vous avez de la fièvre :

Gardez un thermomètre digital (électronique) à la maison et prenez votre température si vous avez chaud ou mal (par exemple, frissons, maux de tête, douleur légère).

- Vous avez de la fièvre si votre température buccale est de:
 - 38,3 °C (100,9 °F) ou plus à tout moment
- OU
- 38 °C (100,4 °F) ou plus pendant au moins une heure.

Si vous avez de la fièvre :

- **Essayez de communiquer avec votre équipe de soins de santé. Si vous n'arrivez pas à la joindre, vous DEVEZ obtenir une aide médicale d'urgence.**
- Demandez à votre équipe de soins de santé de vous fournir la brochure sur la [fièvre](#) pour de plus amples renseignements.

Si vous n'avez pas de fièvre mais que vous présentez des symptômes légers comme des maux de tête ou une douleur légère :

- Demandez à votre équipe de soins de santé quel médicament vous convient.
L'acétaminophène (Tylenol^{MD}) est un choix sécuritaire pour la plupart des gens.
- Parlez à votre équipe de soins de santé avant de commencer à prendre de l'ibuprofène (Advil^{MD}, Motrin^{MD}), du naproxène (Aleve^{MD}) ou ASA (Aspirin^{MD}), car ils peuvent accroître votre risque de saignement ou interagir avec votre traitement contre le cancer.
- Parlez à votre équipe de soins de santé si vous prenez déjà de **l'aspirine à faible dose** pour un problème médical (comme un trouble cardiaque). Il se peut que vous puissiez continuer à en prendre en toute sécurité.

À FAIRE pendant ce traitement :

- **CONSULTEZ** votre équipe de soins de santé avant de vous faire vacciner, de subir une opération, une chirurgie dentaire ou toute autre procédure médicale.

À NE PAS FAIRE pendant ce traitement :

- **NE FUMEZ PAS ET NE BUVEZ PAS** d'alcool pendant ce traitement sans en discuter au préalable avec votre équipe de soins de santé. Le tabac et l'alcool peuvent aggraver les effets secondaires et empêcher votre traitement de fonctionner.
- **NE MANGEZ PAS ET NE BUVEZ PAS** de fruits, de jus ou de produits dérivés de pamplemousses, caramboles ou oranges de Séville pendant votre traitement. Ils peuvent accroître la quantité de médicament dans votre sang et aggraver les effets secondaires.
- **NE CONDUISEZ PAS**, n'utilisez pas de machines et n'exécutez pas de tâches nécessitant d'être alerte si vous vous sentez étourdi.

Comment dois-je conserver ce médicament de façon sécuritaire?

- Conservez ce médicament à température ambiante, dans son emballage original, dans un endroit sec, à l'abri de la chaleur et de la lumière. Conservez-le hors de vue et de portée des enfants et des animaux domestiques.
- Ne jetez pas à la maison vos médicaments non utilisés. Apportez-les à votre pharmacie pour qu'ils soient détruits sans danger.

Comment toucher en toute sécurité des médicaments oraux de traitement contre le cancer

Si vous êtes un patient :

- Lavez-vous les mains avant et après avoir touché votre médicament oral de traitement contre le cancer.
- Avalez chaque comprimé en entier. Ne l'écrasez pas et ne le mâchez pas.

Si vous êtes un aidant :

- Portez des gants en nitrile ou en latex lorsque vous touchez les comprimés, les capsules ou les liquides.
- Lavez-vous les mains avant d'enfiler vos gants et après les avoir enlevés, même si votre peau n'a pas touché le médicament.
- Jetez vos gants après chaque utilisation. Ne réutilisez pas les gants.
- Ne touchez pas de médicaments de traitement contre le cancer si vous êtes enceinte ou si vous allaitez.

Que faire si votre médicament oral de traitement contre le cancer touche votre peau ou vos yeux

Si le médicament touche votre peau :

- Lavez votre peau abondamment à l'eau et au savon.
- Si votre peau est rouge ou irritée, parlez-en à votre équipe de soins de santé.

Si le médicament touche vos yeux :

- Rincez vos yeux à l'eau courante immédiatement. Laissez l'eau couler sur vos yeux ouverts pendant au moins 15 minutes.

Quels sont les effets secondaires de ce médicament?

Le tableau ci-dessus indique les effets secondaires que vous pourriez rencontrer pendant le traitement au sunitinib. Il dresse la liste des effets secondaires des plus fréquents aux moins fréquents. Il est improbable que vous éprouviez tous ces effets secondaires, et vous pourriez en avoir d'autres qui ne sont pas indiqués.

Passez en revue le tableau des effets secondaires pour savoir à quoi vous attendre et quand obtenir de l'aide. Consultez ce tableau si vous rencontrez des effets secondaires pendant votre traitement au sunitinib.

Effets secondaires les plus courants (au moins 50 personnes sur 100)	
Effet secondaire et mesure à prendre	Quand communiquer avec l'équipe de soins de santé
Troubles hépatiques (Peuvent être graves) Votre équipe de soins de santé peut vérifier votre fonction hépatique à l'aide d'une analyse de sang. Les changements hépatiques ne causent généralement pas de symptômes. À quoi s'attendre? • Dans de rares cas, votre peau ou vos yeux pourraient présenter une coloration jaunâtre, votre urine pourrait devenir foncée et vous pourriez ressentir de la douleur du côté droit de votre abdomen. Cela peut être grave. Que faire? Si vous ressentez des symptômes de troubles hépatiques, obtenez une aide médicale d'urgence immédiatement.	Obtenez une aide médicale d'urgence immédiatement.

Vous pouvez consulter la version la plus récente de cette fiche à la page <https://www.cancercareontario.ca/fr/drugs>

Vous trouverez de plus amples renseignements sur le traitement des symptômes à la page <https://www.cancercareontario.ca/fr/symptomes>

Ressources créées par l'équipe chargée du formulaire des médicaments de CCO, avec l'avis de l'équipe de formation des patients et des conseillers des patients et des familles.
septembre 2023

Effets secondaires les plus courants (au moins 50 personnes sur 100)	
Effet secondaire et mesure à prendre	Quand communiquer avec l'équipe de soins de santé
Anomalies des épreuves du rein faites en laboratoire (peut être grave) et protéine dans votre urine (rare) Votre équipe de soins de santé peut rechercher la présence de protéine dans votre urine et contrôler votre fonction rénale régulièrement à l'aide d'analyse de sang. À quoi s'attendre? • Enflure des mains, des chevilles, des pieds ou d'autres parties du corps. • Une prise de poids inhabituelle. • Une douleur dans le bas du dos. • Des contractions musculaires et crampes ou une démangeaison qui persistent. • De la nausée (envie de vomir) et des vomissements. • Des changements au niveau de l'urine, par exemple, moins d'urine que d'habitude. • De la mousse dans l'urine. • Du sang dans l'urine. Que faire? • Si vous présentez l'un de ces symptômes, parlez-en à votre équipe de soins de santé ou rendez-vous immédiatement au service d'urgence.	Obtenez une aide médicale d'urgence immédiatement.
Diarrhée À quoi s'attendre? • Selles molles, liquides, mal formées qui peuvent durer des jours ou des semaines après la fin du traitement. Que faire? Si vous avez la diarrhée : • Prenez des antidiarrhéiques si votre équipe de soins de santé vous en a prescrit ou vous a conseillé d'en prendre. • Ne mangez pas d'aliments ni de boissons contenant des édulcorants	Parlez-en à votre équipe de soins de santé si votre diarrhée ne s'améliore pas après 24 heures suivant la prise de l'antidiarrhéique ou si vous avez la diarrhée plus de sept fois en une journée.

Vous pouvez consulter la version la plus récente de cette fiche à la page <https://www.cancercareontario.ca/fr/drugs>

Vous trouverez de plus amples renseignements sur le traitement des symptômes à la page <https://www.cancercareontario.ca/fr/symptomes>

Ressources créées par l'équipe chargée du formulaire des médicaments de CCO, avec l'avis de l'équipe de formation des patients et des conseillers des patients et des familles.

Effets secondaires les plus courants (au moins 50 personnes sur 100)	
Effet secondaire et mesure à prendre	Quand communiquer avec l'équipe de soins de santé
artificiels (comme la gomme à mâcher ou les boissons « diète »), ni de café ou d'alcool. • Mangez de petits repas et des collations au lieu de deux ou trois gros repas. • Buvez au minimum six à huit tasses de liquide par jour, sauf indication contraire de votre équipe de soins de santé. • Parlez-en à votre équipe de soins de santé si vous ne pouvez pas boire six à huit tasses de liquide par jour quand vous avez la diarrhée. Vous aurez peut-être besoin de boire des liquides spéciaux contenant du sel et du sucre, appelés réhydratation par voie orale. • Parlez-en à votre équipe de soins de santé si votre diarrhée ne s'améliore pas après 24 heures suivant la prise de l'antidiarrhéique ou si vous avez la diarrhée plus de sept fois en une journée. Demandez à votre équipe de soins de santé de vous fournir la brochure sur la diarrhée pour de plus amples renseignements.	
Fatigue À quoi s'attendre? • Sensation de fatigue ou manque d'énergie qui dure longtemps et ne s'améliore pas avec le sommeil ou le repos. Que faire? • Soyez actif. Visez 30 minutes d'exercice modéré (vous devez être capable de parler confortablement pendant l'exercice) la plupart des jours. • Consultez votre équipe de soins de santé avant de commencer toute activité physique. • Allez à votre rythme, ne vous pressez pas. Reportez les activités les moins importantes. Reposez-vous quand vous en avez besoin. • Demandez de l'aide à votre famille ou vos amis avec le ménage, l'épicerie, et les soins des enfants et des animaux de compagnie. • Mangez bien et buvez au minimum six à huit verres d'eau ou autre liquide par jour, sauf indication contraire de votre équipe de soins de santé. • Évitez de conduire ou d'utiliser des machines si vous vous sentez fatigué. Demandez à votre équipe de soins de santé de vous fournir la brochure sur la fatigue pour de plus amples renseignements.	Parlez-en à votre équipe de soins de santé si ces symptômes ne s'améliorent pas ou s'ils sont graves.

Vous pouvez consulter la version la plus récente de cette fiche à la page <https://www.cancercareontario.ca/fr/drugs>

Vous trouverez de plus amples renseignements sur le traitement des symptômes à la page <https://www.cancercareontario.ca/fr/symptomes>

Ressources créées par l'équipe chargée du formulaire des médicaments de CCO, avec l'avis de l'équipe de formation des patients et des conseillers des patients et des familles.

Effets secondaires les plus courants (au moins 50 personnes sur 100)	
Effet secondaire et mesure à prendre	Quand communiquer avec l'équipe de soins de santé
Niveaux supérieurs à la normale d'enzymes du pancréas dans le sang (lipase, amylase) (Peuvent être graves) À quoi s'attendre? - Ces changements ne causent généralement aucun symptôme. - Dans certains cas, vous pourriez ressentir de la douleur au centre de votre abdomen qui rayonne jusque dans le dos. Que faire? - Votre équipe de soins de santé peut vous faire passer des analyses de sang pour surveiller vos niveaux d'enzymes du pancréas. - Si vous présentez les symptômes ci-dessus, parlez-en à votre équipe de soins de santé. Si vous n'arrivez pas à la joindre, vous devez obtenir une aide médicale d'urgence.	Si vous présentez des symptômes, parlez-en à votre équipe de soins de santé. Si vous n'arrivez pas à la joindre, vous devez obtenir une aide médicale d'urgence.
Nausée et vomissements (Généralement légers) À quoi s'attendre? - La nausée est la sensation d'avoir envie de vomir. Vous pourriez aussi avoir la tête qui tourne. - Vous pourriez ressentir de la nausée dans les heures qui suivent votre traitement. Que faire? Pour prévenir la nausée : - Il est plus facile de prévenir la nausée que de la traiter une fois qu'elle se manifeste. - Buvez des liquides clairs et faites de petits repas. Respirez de l'air frais et reposez-vous.	Si les nausées persistent pendant plus de 48 heures ou les vomissements pendant plus de 24 heures ou s'ils sont graves, communiquez avec votre équipe de soins de santé.

Vous pouvez consulter la version la plus récente de cette fiche à la page <https://www.cancercareontario.ca/fr/drugs>

Vous trouverez de plus amples renseignements sur le traitement des symptômes à la page <https://www.cancercareontario.ca/fr/symptomes>

Ressources créées par l'équipe chargée du formulaire des médicaments de CCO, avec l'avis de l'équipe de formation des patients et des conseillers des patients et des familles.

septembre 2023

Page 9 of 26

Effets secondaires les plus courants (au moins 50 personnes sur 100)	
Effet secondaire et mesure à prendre	Quand communiquer avec l'équipe de soins de santé
- Évitez les aliments épicés et frits, ou les aliments dont l'odeur est forte. - Limitez votre consommation de caféine (café, thé) et évitez l'alcool. En cas de nausées ou de vomissements : - Prenez vos médicaments antinauséeux de secours (au besoin) comme ils vous ont été prescrits. - Demandez à votre équipe de soins de santé de vous fournir la fiche Nausées et vomissements pour en savoir davantage. - Communiquez avec votre équipe de soins de santé dans les cas suivants : - Des nausées persistant pendant plus de 48 heures - Des vomissements graves ou persistants pendant plus de 24 heures	

Effets secondaires courants (25 à 49 personnes sur 100)	
Effet secondaire et mesure à prendre	Quand communiquer avec l'équipe de soins de santé
Taux de créatine kinase dans le sang supérieurs à la normale La créatine kinase (également appelée créatine phosphokinase) est une enzyme présente dans vos muscles. Un taux élevé de créatine kinase dans votre sang peut signifier que vous avez des lésions musculaires. Ce médicament peut augmenter le taux de créatine kinase dans votre sang. Que faut-il vérifier? Il est possible d'avoir un taux élevé de créatine kinase sans avoir de symptômes ni de signes visibles ou palpables. Votre équipe de soins de santé peut demander une analyse de sang pour vérifier votre taux de créatine kinase. Dans de rares cas, un taux élevé de créatine kinase peut être à l'origine d'une :	Parlez-en à votre équipe de soins de santé si ces symptômes ne s'améliorent pas. Obtenez une aide médicale d'urgence suite à l'apparition de symptômes graves.

Vous pouvez consulter la version la plus récente de cette fiche à la page <https://www.cancercareontario.ca/fr/drugs>

Vous trouverez de plus amples renseignements sur le traitement des symptômes à la page <https://www.cancercareontario.ca/fr/symptomes>

Ressources créées par l'équipe chargée du formulaire des médicaments de CCO, avec l'avis de l'équipe de formation des patients et des conseillers des patients et des familles.
septembre 2023

Effets secondaires courants (25 à 49 personnes sur 100)	
Effet secondaire et mesure à prendre	Quand communiquer avec l'équipe de soins de santé
◦ douleur ou faiblesse musculaire grave, ou ◦ urine de couleur rouge foncé ou marron • Les lésions musculaires graves peuvent entraîner des problèmes rénaux. Vous avez peut-être les signes suivants : ◦ Nouveau gonflement des mains, des chevilles, des pieds ou d'autres parties du corps ◦ Prise de poids anormale pour vous ◦ Douleur dans le bas du dos ◦ Changements dans la miction (urine), par exemple moins d'urine que d'habitude Que faire? • Parlez à votre équipe de soins de santé si vous avez des douleurs, une sensibilité ou une faiblesse musculaires inexplicables, ou si vous présentez des signes de problèmes rénaux. Si vous souffrez de douleurs ou de faiblesses musculaires graves et que vos urines sont de couleur foncée, obtenez immédiatement de l'aide médicale d'urgence.	
Changements du goût À quoi s'attendre? • Le goût des aliments et boissons peut vous sembler différent. Que faire? • Mangez des aliments faciles à mâcher, comme des œufs brouillés, des pâtes, des soupes, et des légumes cuits. • Goûtez les aliments à différentes températures, car cela peut modifier le goût. • Essayez différentes formes de nourriture, comme des aliments frais, congelés ou en boîte. • Faites des essais avec des plats non épicés, épicés et assaisonnés.	Parlez-en à votre équipe de soins de santé si ces symptômes ne s'améliorent pas ou s'ils sont graves.

Vous pouvez consulter la version la plus récente de cette fiche à la page <https://www.cancercareontario.ca/fr/drugs>

Vous trouverez de plus amples renseignements sur le traitement des symptômes à la page <https://www.cancercareontario.ca/fr/symptomes>

Ressources créées par l'équipe chargée du formulaire des médicaments de CCO, avec l'avis de l'équipe de formation des patients et des conseillers des patients et des familles.
septembre 2023

Effets secondaires courants (25 à 49 personnes sur 100)	
Effet secondaire et mesure à prendre	Quand communiquer avec l'équipe de soins de santé
Trop ou trop peu de sel dans votre organisme À quoi s'attendre? • Spasmes musculaires, crampes, faiblesse, contractions musculaires ou convulsions. • Rythme cardiaque irrégulier, confusion ou changements de la pression artérielle. Que faire? Obtenez une aide médicale d'urgence immédiatement.	Obtenez une aide médicale d'urgence immédiatement en cas de symptômes graves.
Brûlures d'estomac; troubles gastriques; ballonnements À quoi s'attendre? • Douleur ou brûlure au milieu ou en haut de la poitrine. Elle peut empirer quand vous vous allongez ou vous vous penchez, ou quand vous avalez. • Un goût amer ou acide dans votre bouche. Que faire? • Buvez des liquides clairs et mangez de petits repas. • Ne mangez pas d'aliments acides, gras ou épicés. • Limitez votre consommation de caféine (café, thé) et évitez l'alcool. • Évitez de fumer ou de vous trouver en présence de fumée de tabac. • Tenez-vous assis ou debout après avoir mangé. Ne vous allongez pas. • Élevez la tête de votre lit de six à huit pouces. Vous pouvez utiliser des oreillers supplémentaires pour y parvenir.	Parlez-en à votre équipe de soins de santé si ces symptômes ne s'améliorent pas ou s'ils sont graves.

Vous pouvez consulter la version la plus récente de cette fiche à la page <https://www.cancercareontario.ca/fr/drugs>

Vous trouverez de plus amples renseignements sur le traitement des symptômes à la page <https://www.cancercareontario.ca/fr/symptomes>

Ressources créées par l'équipe chargée du formulaire des médicaments de CCO, avec l'avis de l'équipe de formation des patients et des conseillers des patients et des familles.
septembre 2023

Effets secondaires courants (25 à 49 personnes sur 100)	
Effet secondaire et mesure à prendre	Quand communiquer avec l'équipe de soins de santé
Ulcères buccaux À quoi s'attendre? - Des ulcères ronds, douloureux, gris ou blancs peuvent apparaître dans votre bouche sur la langue, les lèvres, les gencives ou à l'intérieur de vos joues. - Dans des cas plus graves, il peut être difficile d'avaler, de manger ou de se brosser les dents. - Ils peuvent durer 3 jours ou plus. Que faire? Pour prévenir les ulcères buccaux : - Prenez soin de votre bouche en vous brossant les dents doucement et en passant de la soie dentaire régulièrement. - Rincez-vous souvent la bouche à l'aide d'un rince-bouche maison. - Pour préparer un rince-bouche maison, mélangez une cuillère à thé de bicarbonate de soude et une cuillère à thé de sel dans quatre tasses (1 l) d'eau. - N'utilisez pas de rince-bouches vendus dans le commerce, en particulier ceux qui contiennent de l'alcool, car ils peuvent irriter votre bouche. En cas d'ulcères buccaux : - Évitez les aliments chauds, épicés, acidulés, durs ou croquants. - Votre médecin pourrait prescrire un rince-bouche pour soulager les ulcères buccaux et prévenir l'infection. - Parlez-en à votre équipe de soins de santé dès que vous remarquez des ulcères buccaux ou sur vos lèvres, ou si vous avez de la difficulté à manger, boire ou avaler. Demandez à votre équipe de soins de santé de vous fournir la fiche soins bucco-dentaires pour en savoir davantage.	Parlez-en à votre équipe de soins de santé dès que vous remarquez des ulcères buccaux ou sur vos lèvres, ou si vous avez de la difficulté à manger, boire ou avaler.

Effets secondaires courants (25 à 49 personnes sur 100)	
Effet secondaire et mesure à prendre	Quand communiquer avec l'équipe de soins de santé
Faible appétit À quoi s'attendre? • Perte d'intérêt envers la nourriture ou perte de la sensation de faim. • Perte de poids. Que faire? • Essayez de manger vos aliments préférés. • Mangez des petits repas tout au long de la journée. • Vous pourriez avoir besoin de prendre des suppléments pour vous aider à maintenir votre poids. • Parlez-en à votre équipe de soins de santé si vous n'avez pas d'appétit. Demandez à votre équipe de soins de santé de vous fournir la fiche Perte d'appétit pour en savoir davantage.	Parlez-en à votre équipe de soins de santé si ces symptômes ne s'améliorent pas ou s'ils sont graves.
Changements de couleur de la peau ou des cheveux À quoi s'attendre? • Votre peau pourrait prendre une couleur jaune. • La couleur de votre peau ou de vos cheveux pourrait s'éclaircir. Que faire? • Cela est dû à la couleur du sunitinib (jaune). Ce n'est pas nocif ni douloureux, et les choses reviennent généralement à la normale après le traitement. • Parlez-en à votre équipe de soins de santé si cela vous dérange ou si vous constatez une coloration jaune du blanc de vos yeux, des urines foncées ou brunes, une fatigue intense, des saignements ou des bleus inhabituels.	Parlez-en à votre équipe de soins de santé si cela vous dérange ou si vous constatez une coloration jaune du blanc de vos yeux, des urines foncées ou brunes, une fatigue intense, des saignements ou des bleus inhabituels.

Vous pouvez consulter la version la plus récente de cette fiche à la page <https://www.cancercareontario.ca/fr/drugs>

Vous trouverez de plus amples renseignements sur le traitement des symptômes à la page <https://www.cancercareontario.ca/fr/symptomes>

Ressources créées par l'équipe chargée du formulaire des médicaments de CCO, avec l'avis de l'équipe de formation des patients et des conseillers des patients et des familles.
septembre 2023

Effets secondaires courants (25 à 49 personnes sur 100)	
Effet secondaire et mesure à prendre	Quand communiquer avec l'équipe de soins de santé
Éruptions cutanées, peau sèche, démangeaisons (Peuvent être graves) À quoi s'attendre? • Votre peau pourrait être craquelée, rugueuse ou peler à certains endroits. • Votre peau pourrait être rouge ou chaude au toucher, comme avec un coup de soleil. • Votre peau pourrait vous démanger, vous brûler, piquer ou être très sensible au toucher. • L'éruption cutanée peut se manifester à des emplacements où vous avez reçu des rayonnements auparavant. Que faire? Pour prévenir et traiter la peau sèche : • Utilisez un hydratant pour la peau sans parfum. • Protégez votre peau du soleil et du froid. • Appliquez un écran solaire vous protégeant contre les UVA et UVB avec un FPS d'au moins 30. • Évitez les produits parfumés et les lotions contenant de l'alcool. • Buvez 6 à 8 tasses de liquide non alcoolisé, sans caféine chaque jour, sauf indication contraire de votre équipe de soins de santé. Les éruptions cutanées peuvent être graves dans de rares cas et entraîner la formation de cloques ou la desquamation de votre peau. Si cela se produit, obtenez une aide médicale d'urgence immédiatement.	Parlez-en à votre équipe de soins de santé si ces symptômes ne s'améliorent pas ou s'ils sont graves.
Éruption cutanée sur les mains et les pieds (syndrome main-pied) À quoi s'attendre? • Fourmillement ou enflure de la peau sur la paume des mains et la plante des pieds. Cette peau peut devenir douloureuse, rouge et engourdie. • Dans les cas les plus graves, votre peau peut commencer à peler et vous	Parlez-en à votre équipe de soins de santé si ces symptômes ne s'améliorent pas ou s'ils sont graves.

Vous pouvez consulter la version la plus récente de cette fiche à la page <https://www.cancercareontario.ca/fr/drugs>

Vous trouverez de plus amples renseignements sur le traitement des symptômes à la page <https://www.cancercareontario.ca/fr/symptomes>

Ressources créées par l'équipe chargée du formulaire des médicaments de CCO, avec l'avis de l'équipe de formation des patients et des conseillers des patients et des familles.
septembre 2023 Page 15 of 26

Effets secondaires courants (25 à 49 personnes sur 100)	
Effet secondaire et mesure à prendre	Quand communiquer avec l'équipe de soins de santé
pouvez avoir des cloques ou des plaies. • Cela peut se produire des jours ou des semaines après le début du traitement. Que faire? Pour prévenir le syndrome d'enflure douloureuse des mains et des pieds • Évitez les activités qui peuvent causer une pression ou une friction sur votre peau, comme faire du nettoyage intensif, utiliser des outils, taper à l'ordinateur, jouer d'un instrument de musique ou conduire une voiture. • Hydratez vos mains et vos pieds souvent, particulièrement au niveau des plis de la peau. • Portez des vêtements et des chaussures amples et confortables. • Reposez-vous et évitez de rester longtemps debout. • Évitez d'exposer vos mains et vos pieds à une chaleur excessive. Demandez à votre équipe de soins de santé de vous fournir la fiche Syndrome main-pied pour de plus amples renseignements.	
Hypertension artérielle (Peut être grave) À quoi s'attendre? • Il n'y a généralement pas de signe d'hypertension artérielle. • Dans de rares cas, vous pourriez avoir des maux de tête, être essoufflé ou saigner du nez. Que faire? • Contrôlez votre pression artérielle régulièrement. • Votre médecin peut vous prescrire des médicaments pour traiter l'hypertension artérielle. En cas de maux de tête graves, obtenez une aide médicale d'urgence immédiatement, car cela peut être un signe d'hypertension artérielle.	Parlez-en à votre équipe de soins de santé si ces symptômes ne s'améliorent pas ou s'ils sont graves.

Vous pouvez consulter la version la plus récente de cette fiche à la page <https://www.cancercareontario.ca/fr/drugs>

Vous trouverez de plus amples renseignements sur le traitement des symptômes à la page <https://www.cancercareontario.ca/fr/symptomes>

Ressources créées par l'équipe chargée du formulaire des médicaments de CCO, avec l'avis de l'équipe de formation des patients et des conseillers des patients et des familles.
septembre 2023

Effets secondaires courants (25 à 49 personnes sur 100)	
Effet secondaire et mesure à prendre	Quand communiquer avec l'équipe de soins de santé
Hématomes ou saignements inhabituels (Peuvent être graves) À quoi s'attendre? • Surveillez les signes de saignement : ◦ Saignement des gencives ◦ Saignements du nez inhabituels ou importants ◦ Apparition d'ecchymoses plus fréquentes que la normale ◦ Selles de couleur noire, ou sang dans les selles ◦ Toux avec crachat de couleur rouge ou brune ◦ Étourdissements, maux de tête constants ou changements de la vision ◦ Saignements vaginaux importants ◦ Urine de couleur rouge ou rose Que faire? • Consultez votre équipe de soins de santé avant de vous rendre chez le dentiste, ou si vous avez une opération prévue. • Prenez soin de votre bouche et utilisez une brosse à dents souple. • Éviter les coupures et ecchymoses. • Demandez à votre équipe de soins de santé quelles activités vous pouvez pratiquer en toute sécurité. Si vous observez des signes de saignement : • En cas de léger saignement, nettoyez la zone à l'aide de savon et d'eau ou de solution de rinçage saline (eau salée). Appliquez une pression pendant au moins 10 minutes. En cas de saignement grave ou qui ne s'arrête pas (saignement important), vous devez obtenir une aide médicale d'urgence immédiatement.	Parlez-en à votre équipe de soins de santé en cas de signes de saignement. En cas de saignement grave ou qui ne s'arrête pas (saignement important), vous DEVEZ obtenir une aide médicale d'urgence immédiatement.

Vous pouvez consulter la version la plus récente de cette fiche à la page <https://www.cancercareontario.ca/fr/drugs>

Vous trouverez de plus amples renseignements sur le traitement des symptômes à la page <https://www.cancercareontario.ca/fr/symptomes>

Ressources créées par l'équipe chargée du formulaire des médicaments de CCO, avec l'avis de l'équipe de formation des patients et des conseillers des patients et des familles.
septembre 2023

Effets secondaires courants (25 à 49 personnes sur 100)	
Effet secondaire et mesure à prendre	Quand communiquer avec l'équipe de soins de santé
Troubles cardiaques (Peuvent être graves) À quoi s'attendre? • Vous pourriez avoir un rythme cardiaque irrégulier, un essoufflement, une douleur dans la poitrine ou des malaises. • Des enflures au niveau des jambes, des chevilles et du ventre. • Une douleur aiguë au centre ou à gauche de la poitrine (qui empire souvent lorsque vous respirez profondément). • Une fatigue extrême qui vous empêche de faire de l'exercice ou de pratiquer des activités normales. Que faire? Obtenez une aide médicale d'urgence immédiatement.	Obtenez une aide médicale d'urgence immédiatement.

Effets secondaires moins courants (10 à 24 personnes sur 100)	
Effet secondaire et mesure à prendre	Quand communiquer avec l'équipe de soins de santé
Faible quantité de neutrophiles (globules blancs) dans le sang (neutropénie) (Peuvent être graves) Lorsque vous avez peu de neutrophiles, vous risquez de contracter des infections plus facilement. Demandez à votre équipe de soins de santé de vous fournir la fiche Neutropénie (faible taux de neutrophiles) pour en savoir davantage.	Si vous avez de la fièvre, essayez de communiquer avec votre équipe de soins de santé. Si vous n'êtes pas en mesure de la joindre pour obtenir des conseils, vous

Effets secondaires moins courants (10 à 24 personnes sur 100)	
Effet secondaire et mesure à prendre	Quand communiquer avec l'équipe de soins de santé
À quoi s'attendre? • Si vous avez chaud ou mal (par exemple si vous avez des frissons ou une nouvelle toux), vous devez prendre votre température pour voir si vous avez de la fièvre. • Ne prenez pas de médicaments qui font baisser la fièvre avant de prendre votre température (par exemple, Tylenol^{MD}, acétaminophène, Advil^{MD} ou ibuprofène) • Ne consommez pas d'aliments ni de boissons chauds ou froids juste avant de prendre votre température. Vous avez de la fièvre si votre température buccale est de: • 38,3 °C (100,9 °F) ou plus en tout temps OU • 38 °C (100,4 °F) ou plus pendant au moins une heure. Que faire? Si votre équipe de soins de santé vous a dit que vous avez un faible taux de neutrophiles : • Lavez-vous souvent les mains pour éviter les infections. • Consultez votre médecin avant de vous faire vacciner, opérer, de recevoir des soins dentaires ou toute autre intervention médicale. • Gardez un thermomètre numérique à la maison pour pouvoir prendre votre température facilement. Si vous avez de la fièvre : Si vous avez de la fièvre, essayez de communiquer avec votre équipe de soins de santé. Si vous n'arrivez pas à la joindre, vous devez obtenir une aide médicale d'urgence.	devez obtenir une aide médicale d'urgence.

Vous pouvez consulter la version la plus récente de cette fiche à la page <https://www.cancercareontario.ca/fr/drugs>

Vous trouverez de plus amples renseignements sur le traitement des symptômes à la page <https://www.cancercareontario.ca/fr/symptomes>

Ressources créées par l'équipe chargée du formulaire des médicaments de CCO, avec l'avis de l'équipe de formation des patients et des conseillers des patients et des familles.
septembre 2023

Effets secondaires moins courants (10 à 24 personnes sur 100)	
Effet secondaire et mesure à prendre	Quand communiquer avec l'équipe de soins de santé
Glycémie élevée ou faible À quoi s'attendre? • Glycémie élevée ◦ Vous pourriez avoir soif. ◦ Vous pourriez uriner plus souvent que d'habitude. ◦ Vous pourriez vous sentir fatigué ou somnolent. • Faible glycémie ◦ Vous pourriez avoir faim, trembler, vous sentir étourdi, nerveux, faible ou confus. Que faire? • Votre équipe de soins de santé pourrait vous faire passer une analyse de sang pour vérifier le taux de glycémie de votre sang. • Si vous avez du diabète, vérifiez régulièrement votre taux de glycémie. Votre équipe de soins de santé pourrait vous demander de le vérifier plus souvent que d'habitude. • On pourrait vous avoir recommandé de modifier votre alimentation ou vous avoir donné des médicaments pour contrôler votre taux de glycémie. • Pour traiter l'hypoglycémie, prenez 3 à 4 comprimés de glucose, 1 cuillère à table de sucre ou de miel ou 3/4 tasse de jus ou de boisson gazeuse sucrée. • Si vous vous sentez confus ou si vous perdez connaissance, votre aidant devra vous obtenir une assistance médicale d'urgence immédiatement.	Parlez-en à votre équipe de soins de santé le plus tôt possible.
Constipation À quoi s'attendre? • Des selles moins régulières que la normale. • De petites selles qui ressemblent à des granulés. • Le besoin de pousser fort pour faire sortir les selles.	Parlez-en à votre équipe de soins de santé si ces symptômes ne s'améliorent pas ou s'ils sont graves.

Vous pouvez consulter la version la plus récente de cette fiche à la page <https://www.cancercareontario.ca/fr/drugs>

Vous trouverez de plus amples renseignements sur le traitement des symptômes à la page <https://www.cancercareontario.ca/fr/symptomes>

Ressources créées par l'équipe chargée du formulaire des médicaments de CCO, avec l'avis de l'équipe de formation des patients et des conseillers des patients et des familles.
septembre 2023

Effets secondaires moins courants (10 à 24 personnes sur 100)	
Effet secondaire et mesure à prendre	Quand communiquer avec l'équipe de soins de santé
- Des douleurs ou crampes abdominales. - Des ballonnements, la sensation d'être plein, ou inconfortable. - Des fuites de selles liquides. - Beaucoup de gaz ou d'éructations. - Des nausées et vomissements. Que faire? Pour éviter la constipation : - Essayez de manger des aliments à haute teneur en fibre comme des fruits, des légumes-feuilles et des céréales complètes. - Buvez au moins 6 à 8 tasses de liquide chaque jour sauf indication contraire de votre équipe de soins de santé. - Soyez actif. L'activité physique peut vous aider à réguler votre transit. - Si vous prenez des opiacés contre la douleur, demandez à votre équipe de santé si manger plus de fibre est adapté. Pour traiter la constipation : - Si vous n'êtes pas allé à la selle depuis deux ou trois jours, vous pourriez avoir besoin d'un laxatif pour vous aider à avoir un transit régulier. Demandez à votre équipe de soins de santé ce qu'il faut faire. Demandez à votre équipe de soins de santé de vous fournir la fiche Constipation pour en savoir davantage.	
Mal de tête, douleur légère aux articulations, douleurs ou crampes musculaires À quoi s'attendre? - Légers maux de tête - De nouvelles douleurs musculaires ou articulaires, des crampes musculaires, ou des courbatures.	Parlez-en à votre équipe de soins de santé si ces symptômes ne s'améliorent pas ou s'ils sont graves.

Vous pouvez consulter la version la plus récente de cette fiche à la page <https://www.cancercareontario.ca/fr/drugs>

Vous trouverez de plus amples renseignements sur le traitement des symptômes à la page <https://www.cancercareontario.ca/fr/symptomes>

Ressources créées par l'équipe chargée du formulaire des médicaments de CCO, avec l'avis de l'équipe de formation des patients et des conseillers des patients et des familles.
septembre 2023 Page 21 of 26

Effets secondaires moins courants (10 à 24 personnes sur 100)	
Effet secondaire et mesure à prendre	Quand communiquer avec l'équipe de soins de santé
Que faire? - Prenez des antalgiques (acétaminophène ou opiacés tels que la codéine, morphine, hydromorphone, oxycodone) comme prescrit. - Lisez la section ci-dessus : Que faire si je me sens mal, si j'ai des douleurs, des maux de tête ou de la fièvre avant de prendre de l'acétaminophène (Tylenol^{MD}), ibuprofène (Advil^{MD}, Motrin^{MD}), du naproxène (Aleve^{MD}) ou de l'aspirine? Ces médicaments peuvent dissimuler une infection qui nécessite un traitement, ou peuvent aggraver votre risque d'hémorragie. - Reposez-vous souvent et essayez une activité physique légère (comme la marche), cela pourrait vous aider. Demandez à votre équipe de soins de santé de vous fournir la fiche Douleur pour en savoir davantage.	
Étourdissements À quoi s'attendre? - Vous pourriez vous avoir des sensations de vertige ou vous évanouir. Que faire? - Allongez-vous immédiatement pour ne pas tomber. - Levez-vous doucement et commencez à bouger une fois que vous vous sentez mieux. - Ne conduisez pas de véhicule à moteur et n'utilisez pas de machines si vous ressentez un étourdissement.	Parlez-en à votre équipe de soins de santé si ces symptômes ne s'améliorent pas ou s'ils sont graves.
Changements de l'activité thyroïdienne Les changements de l'activité thyroïdienne peuvent se produire des mois après l'administration de votre traitement. Votre équipe de soins de santé pourrait contrôler votre activité thyroïdienne régulièrement au moyen d'un test sanguin.	Parlez-en à votre équipe de soins de santé le plus tôt possible.

Vous pouvez consulter la version la plus récente de cette fiche à la page <https://www.cancercareontario.ca/fr/drugs>

Vous trouverez de plus amples renseignements sur le traitement des symptômes à la page <https://www.cancercareontario.ca/fr/symptomes>

Ressources créées par l'équipe chargée du formulaire des médicaments de CCO, avec l'avis de l'équipe de formation des patients et des conseillers des patients et des familles.
septembre 2023 Page 22 of 26

Effets secondaires moins courants (10 à 24 personnes sur 100)	
Effet secondaire et mesure à prendre	Quand communiquer avec l'équipe de soins de santé
À quoi s'attendre? Hypothyroïdie : • Prise de poids inhabituelle • Manque d'énergie ou sensation de fatigue • Sensation de froid • Peau sèche, ongles et cheveux cassants • Constipation (des selles moins fréquentes que d'habitude) Hyperthyroïdie (rare) : • Perte de poids inhabituelle • Sentiment de stress, d'irritabilité ou difficulté à dormir • Transpiration excessive et difficulté à supporter la chaleur • Appétit accru • Selles plus fréquentes que d'habitude • Faiblesse (particulièrement dans les bras et les cuisses) • Rythme cardiaque rapide ou irrégulier Que faire? Votre équipe de soins de santé pourrait vous donner un médicament sur ordonnance pour traiter l'hypothyroïdie ou l'hyperthyroïdie. Si vous connaissez des changements de poids en plus des autres symptômes indiqués, parlez-en à votre équipe de soins de santé le plus vite possible.	
Difficulté à dormir Vos médicaments peuvent vous causer de la difficulté à dormir. Cela peut s'améliorer à mesure que votre corps s'habitue au médicament ou quand votre traitement se terminera. À quoi s'attendre? • Vous pourriez avoir de la difficulté à vous endormir ou à rester endormi. • La qualité de votre sommeil peut changer au cours de votre traitement.	Parlez-en à votre équipe de soins de santé si ces symptômes ne s'améliorent pas ou s'ils sont graves.

Vous pouvez consulter la version la plus récente de cette fiche à la page <https://www.cancercareontario.ca/fr/drugs>

Vous trouverez de plus amples renseignements sur le traitement des symptômes à la page <https://www.cancercareontario.ca/fr/symptomes>

Ressources créées par l'équipe chargée du formulaire des médicaments de CCO, avec l'avis de l'équipe de formation des patients et des conseillers des patients et des familles.
septembre 2023 Page 23 of 26

Effets secondaires moins courants (10 à 24 personnes sur 100)	
Effet secondaire et mesure à prendre	Quand communiquer avec l'équipe de soins de santé
Par exemple, vous pourriez mal dormir pendant plusieurs nuits, puis bien dormir la nuit suivante. • Vous pourriez vous réveiller trop tôt ou ne pas vous sentir reposé après une nuit de sommeil. • Vous pourriez vous sentir fatigué ou somnolent pendant la journée. Que faire? Parlez-en à votre équipe de soins de santé si ces symptômes ne s'améliorent pas ou s'ils sont graves	
Troubles oculaires À quoi s'attendre? • Vous pourriez avoir les yeux secs, irrités ou douloureux. • Ils pourraient être rouges et larmoyants. • Ils pourraient être sensibles à la lumière et vous pourriez voir trouble. Que faire? • Éviter de porter des lentilles de contact. • Portez des lunettes de soleil avec protection contre les UV. • Utilisez des lunettes de protection (ou un casque avec écran facial) lorsque vous pratiquez des sports, que vous tondez la pelouse ou que vous pratiquez toute activité lors de laquelle vous pourriez avoir des particules ou de la fumée dans les yeux. • Vous pourriez essayer des larmes artificielles (gouttes) ou pommades.	Parlez-en à votre équipe de soins de santé le plus tôt possible.

D'autres effets secondaires rares mais graves sont possibles.

Si vous rencontrez L'UN des symptômes suivants, vous devez parler à votre équipe de soins de santé ou recevoir immédiatement des soins médicaux d'urgence :

- Douleur, enflure et durcissement de la veine dans un bras ou une jambe
- Maux de tête graves, confusion, épilepsie
- Perte soudaine de la vue, difficulté à parler ou à bouger les bras ou les jambes
- Peu ou pas d'urine, changements de poids inhabituels
- Assombrissement de la peau ou sensation de fatigue inhabituelle
- Faiblesse d'un côté du corps
- Douleur aiguë dans la poitrine, le haut du dos, qui monte dans votre cou ou descend dans votre

Vous pouvez consulter la version la plus récente de cette fiche à la page <https://www.cancercareontario.ca/fr/drugs>

Vous trouverez de plus amples renseignements sur le traitement des symptômes à la page <https://www.cancercareontario.ca/fr/symptomes>

Ressources créées par l'équipe chargée du formulaire des médicaments de CCO, avec l'avis de l'équipe de formation des patients et des conseillers des patients et des familles.
septembre 2023 Page 24 of 26

dos, alors que vous ne vous êtes pas blessé

- Nouvelle toux inhabituelle, difficulté à respirer, présence de sang dans la toux, voix rauque ou éraillée inhabituelle
- Palpitations inhabituelles au niveau de la poitrine ou du ventre
- Démangeaisons graves, éruptions cutanées, lèvres visage ou langue enflés, oppression de la poitrine ou de la gorge
- Douleur aiguë au ventre et changements de vos selles, difficulté à avaler
- Peau rouge, enflée et très douloureuse, qui peut être chaude ou virer au violet.
- Blessures qui ne guérissent pas bien
- Suppuration inhabituelle au niveau des gencives, dents déchaussées et sensation d'engourdissement et de lourdeur de la mâchoire

Qui joindre si j'ai des questions ou besoin d'aide?

Mon fournisseur de soins de santé de cancérologie est :

Pendant la journée, je dois joindre :

En soirée, fin de semaine et durant les jours fériés
:

Autres remarques :

[illegible]

September 2023 Updated Side effects section (Mise à jour de la section « Les effets secondaires »)

Les renseignements présentés dans les fiches d'information sur les médicaments, les fiches d'information sur les régimes et les renseignements à l'intention des patients pour le traitement des symptômes figurant dans le Formulaire pharmaceutique (le "Formulaire") ne sont offerts aux spécialistes de la santé et aux patients qu'à des fins d'information. Ces données ne visent pas à couvrir l'ensemble des utilisations, instructions, précautions, interactions médicamenteuses ou effets secondaires d'un médicament en particulier, et ne doivent pas servir à indiquer qu'une utilisation particulière d'un médicament est sans danger, approprié ou efficace pour un trouble de santé donné.

Les patients doivent toujours consulter un fournisseur de soins de santé s'ils ont des questions touchant l'information présentée dans le Formulaire. L'information du Formulaire ne vise pas à fournir ou remplacer une consultation médicale et ne doit pas servir à cette fin. L'utilisation du Formulaire doit être assujettie à une opinion clinique et les régimes prescrits peuvent ne pas concorder avec l'information du Formulaire.