

Fiche d'information sur les médicaments

trastuzumab (tras-tu-zu-mab)

Ce document fournit des renseignements généraux à propos de votre médicament. Il ne remplace pas les conseils de votre équipe de spécialistes des soins de santé. Vous devez toujours discuter de votre traitement avec votre spécialiste des soins de santé et consulter la notice d'accompagnement du produit pour plus de détails.

Autre nom(s): Herceptin^{MD}, Ogivri^{MD}, Trazimera^{MD}, Herzuma^{MD}, Kanjinti^{MD}, Ontruzant^{MD}

Présentation: solution transparente incolore mélangée dans de grands sacs de liquide

Pourquoi ce médicament est-il utilisé?

- Pour le traitement de certains types de cancer du sein, de l'estomac ou de l'œsophage et d'autres maladies
- Le trastuzumab est proposé sous forme de médicament biosimilaire. Consultez notre brochure sur les [biosimilaires](#) pour de plus amples renseignements.

Qu'est-ce que je dois faire avant d'avoir ce médicament?

- Dites à votre médecin et votre pharmacien si vous avez ou avez eu des troubles de santé importants, comme :
 - ◊ des troubles cardiaques ou pulmonaires,
 - ◊ des troubles respiratoires au repos;
 - ◊ des allergies.
- Dites à votre équipe de soins de santé si vous avez déjà mal réagi à l'alcool benzylique.
- Dites-lui également si vous avez déjà été traité avec des médicaments de chimiothérapie (en particulier des anthracyclines comme doxorubicine ou épirubicine, ou d'autres médicaments apparentés comme le mitoxantrone) ou si vous avez déjà reçu une radiothérapie.

N'oubliez pas de :

- Parler à votre équipe de soins de santé de tous les autres médicaments que vous prenez.
- Continuer à prendre les autres médicaments qui vous ont été prescrits, sauf indication contraire de votre équipe de soins de santé.

Vous pouvez consulter la version la plus récente de cette fiche à la page <https://www.cancercareontario.ca/fr/drugs>

Vous trouverez de plus amples renseignements sur le traitement des symptômes à la page <https://www.cancercareontario.ca/fr/symptomes>

Ressources créées par l'équipe chargée du formulaire des médicaments de CCO, avec l'avis de l'équipe de formation des patients et des conseillers des patients et des familles.
septembre 2022

Comment ce médicament affecte-il les relations sexuelles, la grossesse et l'allaitement?

Communiquez avec votre équipe de soins de santé sur les sujets suivants :

- Comment ce traitement pourrait influencer sur votre santé sexuelle.
- Comment ce traitement pourrait influencer sur votre capacité à avoir un enfant, si cela s'applique à vous.

Ce traitement peut être nocif pour le fœtus. Parlez-en à votre équipe de soins de santé si vous (ou votre partenaire) êtes enceinte, tombez enceinte pendant le traitement, ou si vous allaitez.

- S'il y a le **moindre** risque de grossesse, vous et votre partenaire devez **utiliser deux méthodes efficaces de contraception simultanément** pendant **7 mois** après votre dernière dose de traitement. Renseignez-vous auprès de votre équipe de soins de santé pour connaître les meilleures solutions contraceptives pour vous.
- N'utilisez pas de contraceptif hormonal (comme la pilule contraceptive), sauf si votre équipe de soins de santé vous indique que vous pouvez le faire en toute sécurité. Demandez à votre équipe de soins de santé quelle est la méthode contraceptive la plus sûre pour vous.
- N'allaitiez pas pendant ce traitement.

Comment ce médicament est-il donné?

- Ce médicament est injecté dans une veine (par voie intraveineuse). Communiquez avec votre équipe de soins de santé pour connaître votre régime de traitement.
- Ce médicament vous sera administré sur une longue période pour le premier cycle. Si vous le tolérez bien, il vous sera administré sur de plus courtes périodes pour les autres cycles.
- Si vous avez raté votre rendez-vous pour recevoir le traitement, communiquez avec votre équipe de soins de santé pour connaître la marche à suivre.

Qu'est-ce que je dois savoir de plus lorsque je prends ce médicament?

Ce médicament interagira-t-il avec d'autres médicaments ou d'autres produits de santé naturels?

- Bien qu'il soit peu probable que ce médicament interagisse avec d'autres médicaments, des vitamines, des aliments et produits de santé naturels, informez votre équipe de soins de santé si vous prenez :
 - ◊ Des médicaments et toutes les autres drogues, telles que la marijuana (médicale ou récréative) avec ou sans ordonnance;
 - ◊ Des produits naturels comme des vitamines, des tisanes, des médicaments homéopathiques et d'autres suppléments.
- Consultez votre équipe de soins de santé avant de commencer ou d'arrêter l'un d'entre eux.

Que faire si je me sens mal, que j'ai des douleurs, des maux de tête ou de la fièvre?

- Prenez **toujours** votre température pour savoir si vous avez de la fièvre **avant** de prendre des médicaments pour la fièvre ou la douleur (comme l'acétaminophène (Tylenol^{MD}) ou l'ibuprofène (Advil^{MD})).
 - ◊ La fièvre peut être un signe d'infection pouvant nécessiter un traitement immédiat.
 - ◊ Si vous prenez ces médicaments avant de vérifier si vous avez de la fièvre, ils pourraient faire baisser votre température et vous pourriez ne pas savoir si vous avez une infection.

Comment vérifier si vous avez de la fièvre :

Gardez un thermomètre numérique (électronique) chez vous et prenez votre température si vous vous sentez chaud ou mal (p. ex. frissons, maux de tête, douleur légère).

- Vous avez de la fièvre si votre température orale (prise dans la bouche) est de :
 - ◊ 38,3 °C (100,9 °F) ou plus en tout temps

OU

 - ◊ 38 °C (100,4 °F) ou plus pendant au moins une heure.

Si vous avez de la fièvre :

- **Essayez de communiquer avec votre équipe de soins de santé. Si vous n'êtes pas en mesure de joindre l'équipe pour obtenir des conseils, vous DEVEZ immédiatement obtenir une aide médicale d'urgence.**
- Demandez à votre équipe de soins de santé de vous fournir la brochure sur la [fièvre](#) pour de plus amples renseignements.

Si vous n'avez pas de fièvre, mais que vous avez de légers symptômes comme des maux de tête ou une douleur légère :

- Demandez à votre équipe de soins de santé quel est le bon traitement pour vous. L'**acétaminophène (Tylenol^{MD})** est un choix sécuritaire pour la plupart des gens.
- **Parlez-en à votre équipe de soins avant de prendre** de l'ibuprofène (Advil^{MD}, Motrin^{MD}), du naproxène (Aleve^{MD}) ou de l'Acide acétylsalicylique (Aspirin^{MD}). Ces médicaments pourraient augmenter les risques de saignements ou interagir avec votre traitement contre le cancer.
- Parlez-en à votre équipe de soins de santé si vous prenez déjà une **faible dose d'aspirine** pour un problème médical (comme un trouble cardiaque). Il pourrait être pris en toute sécurité.

À faire pendant que vous prenez ce médicament :

- Consultez votre équipe de soins de santé avant de vous faire vacciner, opérer, de recevoir des soins dentaires ou toute autre intervention médicale.
- Signalez à votre équipe de soins de santé toute infection grave dont vous êtes actuellement atteint ou dont vous avez été atteint par le passé.
- Parlez à votre équipe de soins de santé de votre risque de développer d'autres cancers et des troubles cardiaques à la suite de ce traitement.
- Pensez à demander à quelqu'un de vous conduire à l'hôpital puis chez vous les jours de traitement. Vous pourriez ressentir une somnolence ou des étourdissements après votre traitement.

À ne pas faire pendant que vous prenez ce médicament :

- Ne fumez pas et ne buvez pas d'alcool pendant votre traitement sans en avoir parlé à votre équipe de soins de santé, car cela pourrait accentuer les effets indésirables et nuire à l'efficacité de votre traitement.

Quels sont les effets secondaires de ce médicament?

Le tableau suivant énumère les effets secondaires que vous pouvez observer lorsque vous prenez du trastuzumab, des plus courants aux moins courants. Certains de ces effets secondaires peuvent être provoqués par d'autres médicaments que vous avez pris ou prenez pour traiter votre cancer. Il est peu probable que vous observiez tous les effets secondaires énumérés, et vous pourriez en constater d'autres non indiqués.

Lisez l'ensemble du tableau des effets secondaires pour savoir à quels symptômes il faut prêter attention et quand demander de l'aide. Conservez ce document pendant toute la durée de votre traitement afin que vous puissiez le consulter au besoin.

Effets secondaires moins courants (10 à 24 personnes sur 100)	
Effets secondaires et mesure à prendre	Quand communiquer avec l'équipe de soins de santé
Maux de tête, douleurs articulaires, musculaires ou crampes légères Signes à surveiller - Nouvelles douleurs musculaires ou articulaires, crampes musculaires, ou sensation de douleur généralisée. Que faire? - Prenez des médicaments (acétaminophène ou opioïdes comme la codéine, la morphine, l'hydromorphone, l'oxycodone) selon ce qui vous est prescrit. - Avant de prendre d'autres médicaments (comme l'acétaminophène (Tylenol^{MD}), l'ibuprofène (Advil^{MD}, Motrin^{MD}), le naproxène (Aleve^{MD}) ou l'aspirine), lisez la section intitulée : « Que faire si je me sens mal, que j'ai des douleurs, des maux de tête ou de la fièvre? ». Ces médicaments peuvent dissimuler les symptômes d'une infection qui nécessite un traitement, ou peuvent aggraver votre risque d'hémorragie. - Reposez-vous souvent et essayez de pratiquer une activité physique légère (comme la marche) qui peut aider. Demandez à votre équipe de soins de santé de vous fournir la brochure sur la douleur pour de plus amples renseignements.	Parlez-en à votre équipe de soins de santé si les symptômes sont intenses ou ne s'améliorent pas.

Vous pouvez consulter la version la plus récente de cette fiche à la page <https://www.cancercareontario.ca/fr/drugs>

Vous trouverez de plus amples renseignements sur le traitement des symptômes à la page <https://www.cancercareontario.ca/fr/symptomes>

Ressources créées par l'équipe chargée du formulaire des médicaments de CCO, avec l'avis de l'équipe de formation des patients et des conseillers des patients et des familles.
septembre 2022

Effets secondaires moins courants (10 à 24 personnes sur 100)	
Effets secondaires et mesure à prendre	Quand communiquer avec l'équipe de soins de santé
Fatigue Signes à surveiller - Sensation de fatigue ou manque d'énergie qui dure longtemps et ne s'atténue pas avec le repos ou le sommeil. Que faire? - Soyez actif. Essayez de pratiquer 30 minutes d'activité physique modérée (vous devez réussir à parler confortablement pendant l'exercice) tous les jours ou presque. - Consultez votre équipe de soins de santé avant de commencer une nouvelle activité. - Allez à votre rythme, ne vous pressez pas. Repoussez les activités moins importantes. Reposez-vous quand vous en ressentez le besoin. - Demandez à vos proches de vous aider avec les tâches ménagères, le magasinage, ou pour s'occuper des enfants et animaux de compagnie. - Mangez bien et buvez au moins 6 à 8 verres d'eau ou d'autres liquides chaque jour (sauf si votre équipe de soins de santé vous a demandé de boire plus ou moins). - Évitez de conduire ou d'utiliser des machines si vous êtes fatigué. Demandez à votre équipe de soins de santé de vous fournir la brochure sur la fatigue pour de plus amples renseignements.	Parlez-en à votre équipe de soins de santé si les symptômes sont intenses ou ne s'améliorent pas.
Symptômes pseudo-grippaux (apparition plus probable après la première perfusion) Signes à surveiller Vous pourriez ressentir des frissons ou de la fièvre pendant ou juste après votre perfusion de trastuzumab.	Parlez-en immédiatement à votre équipe de soins de santé.

Vous pouvez consulter la version la plus récente de cette fiche à la page <https://www.cancercareontario.ca/fr/drugs>

Vous trouverez de plus amples renseignements sur le traitement des symptômes à la page <https://www.cancercareontario.ca/fr/symptomes>

Ressources créées par l'équipe chargée du formulaire des médicaments de CCO, avec l'avis de l'équipe de formation des patients et des conseillers des patients et des familles.
septembre 2022

Effets secondaires moins courants (10 à 24 personnes sur 100)	
Effets secondaires et mesure à prendre	Quand communiquer avec l'équipe de soins de santé
Que faire? • Dites-le immédiatement au personnel infirmier si vous ressentez des frissons ou avez l'impression d'avoir de la fièvre pendant ou juste après l'administration de votre traitement à base de trastuzumab. • Pour savoir comment vérifier votre température pour voir si vous avez de la fièvre après avoir quitté l'hôpital, lisez la partie ci-dessus : « Que faire si je me sens mal, que j'ai des douleurs, des maux de tête ou de la fièvre? ».	

D'autres effets secondaires rares mais graves sont possibles.

Si vous rencontrez l'un des symptômes suivants, vous devez en parler à votre équipe de soins de santé ou recevoir immédiatement des soins médicaux d'urgence :

- Arythmie cardiaque, essoufflement, douleur dans la poitrine, évanouissement;
- Apparition de gonflements des jambes, des chevilles ou du ventre;
- Signes de réaction allergique (pendant ou juste après l'administration du médicament) : fièvre, démangeaisons, éruptions cutanées, gonflement des lèvres, du visage ou de la langue, respiration sifflante et gorge ou poitrine serrée;
- Difficultés respiratoires, toux douloureuse, présence de sang dans la toux;
- Douleur et gonflement ou durcissement d'une veine de votre bras ou jambe;
- Difficulté à bouger les bras ou les jambes;
- Faiblesse musculaire aggravée;
- Confusion, changements soudains de la vue, difficulté d'élocution;
- Selles noires, sang dans les urines, saignements qui ne s'arrêtent pas, apparition facile d'hématomes;
- Nouvelle douleur au ventre pouvant s'étendre dans le dos;
- Fièvre, frissons, signes d'infection;
- Rougeurs ou éruptions cutanées dans des zones où vous avez reçu des rayonnements;
- Douleur dans le bas du dos, miction moins fréquente qu'à l'accoutumée, gonflement du corps.

Qui joindre si j'ai des questions ou besoin d'aide?

Mon fournisseur de soins de santé de cancérologie est : _____

Pendant la journée, je dois joindre : _____

En soirée, fin de semaine et durant les jours fériés
: _____

Autres remarques :

September 2022 Updated "Other name" section / Mise à jour de la section « Autre nom(s) »

Les renseignements présentés dans les fiches d'information sur les médicaments, les fiches d'information sur les régimes et les renseignements à l'intention des patients pour le traitement des symptômes figurant dans le Formulaire pharmaceutique (le "Formulaire") ne sont offerts aux spécialistes de la santé et aux patients qu'à des fins d'information. Ces données ne visent pas à couvrir l'ensemble des utilisations, instructions, précautions, interactions médicamenteuses ou effets secondaires d'un médicament en particulier, et ne doivent pas servir à indiquer qu'une utilisation particulière d'un médicament est sans danger, approprié ou efficace pour un trouble de santé donné.

Les patients doivent toujours consulter un fournisseur de soins de santé s'ils ont des questions touchant l'information présentée dans le Formulaire. L'information du Formulaire ne vise pas à fournir ou remplacer une consultation médicale et ne doit pas servir à cette fin. L'utilisation du Formulaire doit être assujettie à une opinion clinique et les régimes prescrits peuvent ne pas concorder avec l'information du Formulaire.

Vous pouvez consulter la version la plus récente de cette fiche à la page <https://www.cancercareontario.ca/fr/drugs>

Vous trouverez de plus amples renseignements sur le traitement des symptômes à la page <https://www.cancercareontario.ca/fr/symptomes>

Ressources créées par l'équipe chargée du formulaire des médicaments de CCO, avec l'avis de l'équipe de formation des patients et des conseillers des patients et des familles.
septembre 2022 Page 8 of 8