

Fiche d'information sur les médicaments

triptoréline

 (trip-TO-réh-line)

Ce document fournit des renseignements généraux à propos de votre médicament. Il ne remplace pas les conseils de votre équipe de spécialistes des soins de santé. Vous devez toujours discuter de votre traitement avec votre spécialiste des soins de santé et consulter la notice d'accompagnement du produit pour plus de détails.

Autre nom(s): Trelstar^{MD}

Présentation: Suspension pour injection

Pourquoi devez-vous prendre ce médicament?

- Pour le traitement du cancer de la prostate

Avant son administration

- Dites à votre médecin et pharmacien si vous avez ou avez déjà eu des troubles de santé importants, plus particulièrement une maladie cardiaque (notamment une irrégularité des pulsations cardiaques), un diabète, une perte ou un amincissement du tissu osseux, des difficultés à uriner ou des allergies.
- Les personnes atteintes d'un cancer sont exposées à un risque élevé d'apparition d'autres formes de cancer (généralement quelques années plus tard) ou de caillots sanguins. Certains médicaments administrés contre le cancer peuvent accroître ces risques, surtout s'ils sont administrés pendant une période prolongée. Vous devriez discuter avec votre médecin de vos préoccupations à propos de ce médicament.

Grossesse et allaitement

- Triptorélin peut être nocif pour le fœtus et ne doit pas être utilisé par les femmes enceintes
- Cette mesure ne s'applique peut-être pas directement dans votre cas, mais s'il y a DES RISQUES que votre partenaire deveniez enceinte, vous-même et votre partenaire devez ► **Utiliser deux méthodes efficaces de contraception simultanément pendant la prise de ce médicament.** Vous devez continuer à utiliser des méthodes contraceptives jusqu'à **six mois** après la dernière dose. Parlez-en avec votre équipe de soins de santé.
- Si votre partenaire devenez enceinte, dites-le immédiatement à votre médecin.
- Effets sur la fertilité: Oui

Comment ce médicament est-il administré?

- Triptorélin est administré par injection dans un muscle par votre médecin ou votre infirmière.
- Plusieurs posologies d'administration sont possibles. Demandez à votre spécialiste des soins de santé à quelle fréquence ce médicament vous est administré.
- N'oubliez pas de vous rendre chez votre médecin pour vos injections répétées. Notez ces dates

sur votre calendrier. Demandez à votre spécialiste des soins de santé quels sont les médicaments et les fournitures que vous devrez apporter lors de votre prochaine visite.

Pendant la prise de ce médicament

- Ce médicament peut interagir avec d'autres médicaments, ce qui peut en réduire l'efficacité ou provoquer des effets secondaires graves.
- Assurez-vous que votre médecin et pharmacien connaissent tous les médicaments que vous prenez (vendus avec ou sans ordonnance, herbes médicinales et suppléments). Avant de commencer à prendre un nouveau médicament ou avant de cesser de le faire, consultez votre médecin ou votre pharmacien.

Sécurité et conservation

- Conservez ce médicament à la température ambiante, dans son emballage original, à l'abri de la chaleur, de la lumière et de l'humidité. Gardez hors de la portée des enfants et des animaux domestiques.
- Ne jetez pas à la maison le médicament non utilisé. Apportez-le à votre pharmacie pour qu'il soit détruit sans danger.

Effets secondaires et que faire

Les effets secondaires suivants sont courants ou graves. Vous n'éprouverez peut-être pas tous ces effets secondaires. D'autres effets secondaires peuvent survenir. Si vous présentez des effets secondaires inhabituels ou qui vous incommode, parlez-en à votre médecin.

| Effets secondaires et que faire | Quand contacter un médecin? |
|--|--|
| Effets Secondaires les Plus Courants | |
| <p>Glycémie élevée</p> <ul style="list-style-type: none"> • Mesurez votre glycémie si vous êtes diabétique. <p>Augmentation importante de la quantité de sucre dans le sang (rarement, soif accrue et besoin fréquent d'uriner)</p> <ul style="list-style-type: none"> • Si ces effets apparaissent, vous devez recevoir des soins médicaux d'urgence. | <p>Contactez votre médecin dès que possible (heures de bureau)</p> |
| <p>Douleurs ou crampes musculaires</p> <ul style="list-style-type: none"> • Prenez les médicaments analgésiques qui vous ont été prescrits par votre médecin, en suivant ses instructions. • Autrement, prenez de l'acétaminophène (Tylenol^{MD}) au besoin pour les douleurs légères. Demandez à votre médecin ou pharmacien quelle est la dose appropriée dans votre cas. • Reposez-vous souvent, mais de l'exercice léger est possible. | <p>Contactez votre médecin si grave ou pas d'amélioration</p> |
| <p>Anémie (fatigue ou faiblesse inhabituelles, pâleur)</p> | <p>Contactez votre médecin si grave</p> |

Vous pouvez consulter les versions les plus récentes et vous procurer des renseignements complémentaires sur le traitement des symptômes à l'adresse: <http://www.cancercare.on.ca/infomed>

Préparé avec la collaboration du Groupe de travail sur les Fiches d'information sur les médicaments de Action Cancer Ontario.
October 2014

| | |
|---|--|
| <ul style="list-style-type: none"> • Peut survenir de quelques jours à quelques semaines après la dose administrée ou après le début du traitement • Peut être attribuable à une faible numération de globules rouges • Se reposer souvent. Avoir une alimentation saine. • De l'exercice léger peut être bénéfique, entrecoupé de courtes périodes d'activité et de pauses. • Ne pas conduire ni opérer de machinerie lourde si vous vous sentez fatigué ou faible. • Certains patients peuvent avoir besoin d'un médicament ou d'une transfusion sanguine pour corriger la faible numération de globules rouges. • Rarement, elle pourrait être grave et votre médecin pourrait vous demander de cesser de prendre le médicament. • Voir aussi le dépliant sur l'Anémie.* | ou pas d'amélioration |
| <p>Symptômes de faibles taux de testostérone</p> <ul style="list-style-type: none"> • Impuissance • Enflure ou douleurs aux seins • Baisse de libido • Les changements d'humeur (par exemple, en sentant déprimé) • Infections urinaires <p>Augmentation de la transpiration et sensations de chaleur (bouffées de chaleur)</p> <ul style="list-style-type: none"> • Évitez les déclencheurs comme l'alcool, la caféine (le thé, le café, le cola), le chocolat, les aliments chauds et épicés, le stress et la chaleur. • Faites de l'exercice régulièrement, tenez au frais, habillez-vous avec des vêtements légers, buvez beaucoup d'eau. Peut s'améliorer avec le temps. | Contactez votre médecin si grave ou pas d'amélioration |
| <p>Irruption de symptômes (douleur au site de la tumeur, douleur aux os, douleur importante au dos, difficulté à la miction ou mauvais contrôle de la vessie ou des intestins)</p> <ul style="list-style-type: none"> • Ces effets apparaissent généralement au cours des deux premières semaines ou au début du traitement. • Si vous présentez des douleurs osseuses graves, une aggravation des difficultés à uriner, une insensibilisation importante ou des difficultés à réaliser des mouvements, téléphonez immédiatement à votre médecin. | Obtenez soins médicaux d'urgence sans délai |
| Effets Secondaires Moins Courants, mais peuvent être Sévères | |
| <p>Déprime qui ne semble pas s'améliorer</p> <ul style="list-style-type: none"> • Tenter de parler à la famille et aux amis, s'alimenter correctement, faire de l'exercice et avoir de bonnes habitudes de sommeil. • Si elle dure plus de deux semaines ou si vous avez des pensées suicidaires, communiquez avec votre médecin. | Contactez votre médecin si grave ou pas d'amélioration |
| <p>Réaction allergique (fièvre, importantes éruptions cutanées, démangeaisons, enflure du visage, des lèvres ou de la langue, serrement à la poitrine ou à la gorge; peut survenir pendant ou peu de temps après l'administration du médicament)</p> | Obtenez soins médicaux d'urgence sans délai |

| | |
|--|--|
| Blocage d'une artère (vaisseau sanguine) dans le cœur, le cerveau, la poitrine, l'abdomen ou les membres. Le blocage peut entraîner un accident vasculaire cérébral (perte soudaine de la vue, de la parole ou de l'usage des membres) ou une crise cardiaque (douleurs dans la poitrine, essoufflement) ou des douleurs dans la poitrine, l'abdomen ou les membres | Obtenez soins médicaux d'urgence sans délai |
| Douleur aux os; Perte osseuse | Contactez votre médecin si grave ou pas d'amélioration |
| Saignement ou problèmes de flux sanguin de (dans) la glande pituitaire (Mal de tête sévère soudain, changements de vision, perte de conscience) | Obtenez soins médicaux d'urgence sans délai |
| Problèmes cardiaques (rythme cardiaque irrégulier, douleurs à la poitrine, évanouissements, enflure des jambes/chevilles/ventre, essoufflement) | Obtenez soins médicaux d'urgence sans délai |
| Convulsions | Obtenez soins médicaux d'urgence sans délai |
| Un caillot sanguin (douleurs ou enflure aux membres, durcissement d'une veine dans un membre), peut survenir dans les poumons (toux soudaine, problèmes de respiration, douleurs thoraciques, crachement de sang) | Obtenez soins médicaux d'urgence sans délai |

Les renseignements présentés dans les fiches d'information sur les médicaments, les fiches d'information sur les régimes et les renseignements à l'intention des patients pour le traitement des symptômes figurant dans le Formulaire pharmaceutique (le "Formulaire") ne sont offerts aux spécialistes de la santé et aux patients qu'à des fins d'information. Ces données ne visent pas à couvrir l'ensemble des utilisations, instructions, précautions, interactions médicamenteuses ou effets secondaires d'un médicament en particulier, et ne doivent pas servir à indiquer qu'une utilisation particulière d'un médicament est sans danger, approprié ou efficace pour un trouble de santé donné.

Les patients doivent toujours consulter un fournisseur de soins de santé s'ils ont des questions touchant l'information présentée dans le Formulaire. L'information du Formulaire ne vise pas à fournir ou remplacer une consultation médicale et ne doit pas servir à cette fin. L'utilisation du Formulaire doit être assujettie à une opinion clinique et les régimes prescrits peuvent ne pas concorder avec l'information du Formulaire.