

## Fiche d'information sur les médicaments

**vanDETanib** (van-DET-a-nib)

*Ce document fournit des renseignements généraux à propos de votre médicament. Il ne remplace pas les conseils de votre équipe de spécialistes des soins de santé. Vous devez toujours discuter de votre traitement avec votre spécialiste des soins de santé et consulter la notice d'accompagnement du produit pour plus de détails.*

**Autre nom(s):** Caprelsa<sup>MD</sup>

**Présentation:** comprimé blanc dans plusieurs concentrations et formes

**Pourquoi ce médicament est-il utilisé?**

- Pour le traitement d'un certain type de cancer de la thyroïde

**Qu'est-ce que je dois faire avant d'avoir ce médicament?**

Informez votre médecin et votre pharmacien si vous avez ou avez eu des problèmes de santé importants, notamment :

- des problèmes cardiaques;
- une hypertension artérielle;
- une anomalie du rythme cardiaque;
- une baisse de la concentration des sels dans le sang;
- des problèmes hépatiques ou rénaux;
- si vous avez subi ou allez subir une intervention chirurgicale;
- ou si vous avez des allergies.

Les personnes atteintes d'un cancer sont exposées à un risque plus élevé d'avoir d'autres cancers et de présenter des caillots sanguins. Certains médicaments peuvent accroître ces risques, plus particulièrement s'ils sont administrés pendant de longues périodes. Si vous avez des préoccupations à propos de ce médicament, parlez-en à votre équipe de soins de santé.

## Comment ce médicament affecte-il les relations sexuelles, la grossesse et l'allaitement?

- La prise de ce médicament par un homme ou une femme peut être nocive pour le fœtus en cas de grossesse. Si vous-même ou votre partenaire êtes enceinte ou prévoyez être enceinte pendant le traitement, ou si vous allaitez, dites-le à votre équipe de soins de santé.
- S'il y a **un risque** que vous-même ou votre partenaire deveniez enceinte, vous-même et votre partenaire devez:
  - ▶ Utiliser deux méthodes efficaces de contraception simultanément pendant la prise de vandétanib. Vous devez continuer à utiliser des méthodes contraceptives jusqu'à **3 mois** (pour les femmes) ou **2 mois** (pour les hommes) après la dernière dose. Parlez-en avec votre équipe de soins de santé.
- Vous ne devez pas allaiter pendant la prise de ce médicament
- Ce médicament peut réduire la fécondité (capacité de devenir enceinte)

## Comment ce médicament est-il donné?

- Prenez ce médicament une fois par jour oralement.
- Avalez les comprimés entiers avec un verre d'eau, avec ou sans nourriture.
- Si vous oubliez une dose, prenez-la immédiatement s'il s'est écoulé moins de 12 heures depuis la dose manquée, autrement sautez cette dose et prenez la dose suivante comme prévu. Ne doublez pas la dose pour compenser la dose oubliée.
- Si vous avez de la difficulté à avaler les comprimés, vous pouvez les dissoudre dans de l'eau, comme suit :
  - ◊ Placez le comprimé entier dans un demi-verre (50 ml) d'eau non gazeuse. N'utilisez pas d'autre liquide.
  - ◊ Agitez l'eau jusqu'à ce que le comprimé se soit dissous. Cela peut prendre environ 10 minutes.
  - ◊ Buvez immédiatement le mélange.
  - ◊ Rincez le verre vide avec un autre demi-verre d'eau et buvez-le.

## Qu'est-ce que je dois savoir de plus lorsque je prends ce médicament?

- Ce médicament peut interagir avec d'autres médicaments et réduire l'efficacité du traitement ou provoquer des effets secondaires graves.
- Assurez-vous que votre équipe de soins de santé connaisse tous vos médicaments (avec ou sans ordonnance, herbes médicinales et suppléments). Avant de commencer à prendre un médicament ou de cesser de le faire, parlez-en à votre équipe de soins de santé.
- Vous ne devez manger ou boire de fruits, de jus ou de produits dérivés de pamplemousses, caramboles ou oranges de Séville pendant votre traitement pour ne pas accroître les effets secondaires.
- Si vous vous blessez ou subissez une intervention chirurgicale, il est possible que vos plaies mettent plus de temps à cicatriser ou ne cicatrisent pas complètement. Adressez-vous à votre équipe de soins de santé avant toute intervention chirurgicale ou visite chez le dentiste.
- **Pour les douleurs légères ou la fièvre:**
  - ◊ Si vous vous sentez mal, prenez votre température avant de prendre des médicaments pour les douleurs ou la fièvre. Ils peuvent masquer la fièvre.
  - ◊ Vous pouvez prendre des comprimés d'acétaminophène (Tylenol<sup>MD</sup>). Demandez à votre équipe de soins de santé quelle est la dose appropriée pour vous.
  - ◊ L'ibuprofène (Advil<sup>MD</sup>, Motrin<sup>MD</sup>), le naproxène (Aleve<sup>MD</sup>) ou l'aspirine (acide acétylsalicylique, ASA), y inclus l'aspirine à faible dose pour les troubles cardiaques, peuvent accroître les risques d'hémorragie. Parlez à votre équipe de soins de santé avant de commencer ou arrêter ces médicaments.
  - ◊ **Parlez à votre équipe de soins de santé ou rendez-vous à la salle d'urgence la plus proche si vous avez de la fièvre.** Voir la fiche [Fièvre](#) pour en savoir davantage.
- La consommation d'alcool et de tabac pendant votre traitement peut accroître certains effets secondaires et rendre votre médicament moins efficace. Parlez à votre équipe de soins de santé de la consommation d'alcool et de tabac pendant votre traitement.

## Quels sont les effets secondaires de ce médicament?

Vous pourrez ne pas avoir tous les effets secondaires ci-après. Vous pourrez aussi avoir des effets secondaires qui ne sont pas indiqués.

Effets secondaires et que faire	Quand contacter un médecin?
<b>Effets Secondaires les Plus Courants (50 ou plus sur 100 personnes)</b>	
<p><b>Déséquilibre en sel</b></p> <p>Cet effet peut provoquer des contractions musculaires, un état de faiblesse grave, des crampes, des épisodes de confusion et une irrégularité des pulsations cardiaques.</p>	<p>Obtenez des soins médicaux d'urgence sans délai.</p>
<p><b>Diarrhées (peuvent être graves)</b></p> <p>Elles peuvent survenir quelques jours ou quelques semaines après l'administration de votre traitement.</p> <p><b>Si vous avez des diarrhées :</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Prenez les médicaments contre les diarrhées si votre équipe de soins de santé vous en a prescrit.</li> <li>• Évitez les aliments ou les boissons comportant du sucre artificiel (p. ex. gomme à mâcher, boissons « diète », café et alcool).</li> <li>• Vous pouvez prendre plusieurs petits repas et des collations plutôt que deux ou trois gros repas.</li> <li>• Consultez votre équipe soignante si vous ne pouvez pas boire six à huit tasses de liquides par jour lorsque vous avez la diarrhée. Vous pourriez avoir besoin d'une solution spéciale composée de sel et de sucre appelée réhydratation par voie orale.</li> </ul> <p>Voir la fiche <a href="#">Diarrhées</a> pour en savoir davantage.</p>	<p>Contactez votre équipe de soins de santé si pas d'amélioration ou grave.</p>
<p><b>Anomalie des éprouves du foie faites en laboratoire</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Votre peau ou vos yeux pourront prendre une coloration jaunâtre, votre urine pourra être plus foncée ou vous pourrez éprouver des douleurs du côté droit de l'abdomen. Parlez-en alors à votre équipe de soins de santé.</li> <li>• Votre médecin pourra contrôler périodiquement la fonction de votre foie à l'aide d'une analyse sanguine.</li> </ul>	<p>Contactez votre équipe de soins de santé si pas d'amélioration ou grave.</p>
<p><b>Changements dans l'activité de la thyroïde</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Cet effet peut survenir quelques semaines ou quelques mois après l'administration de votre traitement.</li> <li>• Votre médecin pourra contrôler périodiquement la fonction de votre thyroïde à l'aide d'une analyse sanguine.</li> </ul> <p><b>Activité insuffisante</b> : portez attention à un gain de poids inhabituel qui s'accompagne des effets suivants : sensation de fatigue ou baisse de l'énergie, peau sèche, ongles ou cheveux qui se brisent facilement, sensibilité au froid.</p>	<p>Contactez votre équipe de soins de santé dès que possible (heures de bureau).</p>

Vous pouvez consulter la version la plus récente de cette fiche à la page <https://www.cancercareontario.ca/fr/drugs>

Vous trouverez de plus amples renseignements sur le traitement des symptômes à la page <https://www.cancercareontario.ca/fr/symptomes>

Ressources créées par l'équipe chargée du formulaire des médicaments de CCO, avec l'avis de l'équipe de formation des patients et des conseillers des patients et des familles.

Effets secondaires et que faire	Quand contacter un médecin?
<b>Effets Secondaires Courants (25-49 sur 100 personnes)</b>	
<p><b>Éruptions cutanées, assèchement de la peau, démangeaisons cutanées</b></p> <p>Les éruptions cutanées peuvent être graves et, dans de rares cas, entraîner la présence de cloques sur la peau ou une desquamation. Si cet effet apparaît, vous devez recevoir immédiatement des soins médicaux d'urgence.</p> <p><b>Pour prévenir et traiter l'assèchement de la peau</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Utilisez un produit hydratant pour la peau.</li> <li>• Protégez votre peau contre le soleil et le froid</li> <li>• Appliquez un écran solaire offrant une protection contre les UVA et les UVB et un FPS d'au moins 30.</li> </ul>	<p>Contactez votre équipe de soins de santé si pas d'amélioration ou grave.</p>
<p><b>Nausées et vomissements (généralement légers)</b></p> <p>Ils peuvent survenir quelques heures ou quelques jours après votre traitement.</p> <p><b>Si vous avez des nausées ou des vomissements:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Prenez les médicaments contre les nausées qui vous ont été prescrits par votre médecin.</li> <li>• Buvez des liquides clairs et prenez de petits repas. Prenez de l'air frais et reposez-vous.</li> <li>• Évitez les aliments épicés, frits ou qui dégagent une forte odeur.</li> <li>• Limitez votre consommation de caféine (p. ex. café, thé) et d'alcool.</li> <li>• Si les médicaments contre les nausées ne permettent pas d'éliminer les nausées et les vomissements, communiquez avec votre équipe de soins de santé.</li> </ul> <p>Voir également la fiche <a href="#">Nausées et vomissements</a> pour en savoir davantage.</p>	<p>Contactez votre équipe de soins de santé si pas d'amélioration ou grave.</p>
<p><b>Tension artérielle élevée (peut être grave)</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Vérifiez périodiquement votre tension artérielle. Votre médecin pourra vous prescrire un médicament pour traiter l'hypertension artérielle.</li> <li>• Si vous avez des maux de tête graves, des étourdissements graves ou si vous perdez connaissance, vous devez recevoir immédiatement des soins médicaux d'urgence étant donné qu'il peut s'agir d'un signe que votre tension artérielle est trop élevée ou trop faible.</li> </ul>	<p>Contactez votre équipe de soins de santé si pas d'amélioration ou grave.</p>

Vous pouvez consulter la version la plus récente de cette fiche à la page <https://www.cancercareontario.ca/fr/drugs>

Vous trouverez de plus amples renseignements sur le traitement des symptômes à la page <https://www.cancercareontario.ca/fr/symptomes>

Ressources créées par l'équipe chargée du formulaire des médicaments de CCO, avec l'avis de l'équipe de formation des patients et des conseillers des patients et des familles.

Effets secondaires et que faire	Quand contacter un médecin?
<b>Effets Secondaires Courants (25-49 sur 100 personnes)</b>	
<p><b>Maux de tête</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Prenez les médicaments analgésiques qui vous ont été prescrits par votre médecin.</li> <li>• Vous pouvez prendre des comprimés d'acétaminophène (Tylenol<sup>MD</sup>), contre les douleurs légères. Demandez à votre médecin ou à votre pharmacien quelle est la dose appropriée pour vous.</li> <li>• Parlez à votre médecin ou à votre pharmacien avant de commencer à prendre de l'ibuprofène (Advil<sup>MD</sup>, Motrin<sup>MD</sup>), du naproxène (Aleve<sup>MD</sup>) ou de l'aspirine. Ces médicaments peuvent accroître les risques d'hémorragie.</li> <li>• Reposez-vous souvent et essayez de faire des exercices légers.</li> </ul>	<p>Contactez votre équipe de soins de santé si pas d'amélioration ou grave.</p>

Effets secondaires et que faire	Quand contacter un médecin?
<b>Effets Secondaires Moins Courants (10-24 sur 100 personnes)</b>	
<p><b>Fatigue</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Restez actif et essayez de faire 30 minutes d'exercices modérés (qui vous permettent de parler facilement pendant vos exercices) plus d'un jour sur deux.</li> <li>• Avant de commencer de nouveaux exercices, parlez-en à votre équipe de soins de santé.</li> <li>• Prenez votre temps et évitez de vous presser. Reposez-vous quand vous en avez besoin.</li> <li>• Maintenez une bonne alimentation et restez hydraté en buvant au moins 6 à 8 verres d'eau ou d'autres liquides tous les jours (sauf si votre médecin vous demande de boire moins ou davantage).</li> <li>• Évitez de conduire ou d'utiliser de la machinerie si vous vous sentez fatigué.</li> </ul> <p>Voir la fiche <a href="#">Fatigue</a> pour en savoir davantage.</p>	<p>Contactez votre équipe de soins de santé si pas d'amélioration ou grave.</p>
<p><b>Perte d'appétit</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Vous pourrez ne pas avoir envie de manger ou perdre du poids.</li> <li>• Essayez de manger les aliments que vous aimez et de prendre de petits repas pendant toute la journée.</li> </ul>	<p>Contactez votre équipe de soins de santé si pas d'amélioration ou grave.</p>

Vous pouvez consulter la version la plus récente de cette fiche à la page <https://www.cancercareontario.ca/fr/drugs>

Vous trouverez de plus amples renseignements sur le traitement des symptômes à la page <https://www.cancercareontario.ca/fr/symptomes>

Ressources créées par l'équipe chargée du formulaire des médicaments de CCO, avec l'avis de l'équipe de formation des patients et des conseillers des patients et des familles.

Effets secondaires et que faire	Quand contacter un médecin?
<b>Effets Secondaires Moins Courants (10-24 sur 100 personnes)</b>	
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Vous devrez peut-être prendre des suppléments alimentaires pour maintenir votre poids corporel.</li> <li>• Si vous manquez d'appétit, parlez-en à votre équipe de soins de santé.</li> </ul> <p>Voir également la fiche <a href="#">Perte d'appétit</a> pour en savoir davantage.</p>	
<p><b>Troubles du rein (peuvent être graves)</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Les signes de trouble rénaux comprennent un gonflement, la diminution ou l'interruption du débit urinaire ou un gain de poids inhabituel. Si vous présentez ces symptômes, communiquez avec votre équipe de soins de santé ou rendez-vous à la salle d'urgence la plus proche.</li> <li>• Afin de prévenir des troubles de vessies ou de reins, votre médecin pourra vous demander de boire au moins 6 à 8 tasses (2 L) de liquide par jour pendant votre traitement, sauf indication contraire.</li> <li>• Votre médecin pourra contrôler périodiquement votre fonction rénale.</li> </ul>	<p>Obtenez des soins médicaux d'urgence sans délai.</p>
<p><b>Douleurs ou crampes dans l'abdomen</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Si vous souffrez de constipation ou de diarrhées, elles peuvent provoquer des douleurs dans votre abdomen.</li> <li>• Si la douleur est grave et si elle s'accroît ou ne disparaît pas, demandez à votre équipe de soins de santé quelles sont les autres causes possibles.</li> </ul>	<p>Contactez votre équipe de soins de santé si pas d'amélioration ou grave.</p>
<p><b>Rythme cardiaque irrégulier (peut être grave)</b></p>	<p>Obtenez des soins médicaux d'urgence sans délai.</p>
<p><b>Difficulté à dormir</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Cet effet secondaire peut être provoqué par l'un de vos médicaments et il peut s'amenuiser quand votre organisme sera habitué au médicament ou à la fin de votre traitement.</li> <li>• Si cet effet vous incommode, parlez-en à votre médecin.</li> </ul>	<p>Contactez votre équipe de soins de santé si pas d'amélioration ou grave.</p>
<p><b>Sensibilité de la peau au soleil</b></p> <p>Votre peau pourra être davantage sensible au soleil. Vous pourrez présenter une éruption cutanée accompagnée de démangeaisons ou d'autres réactions cutanées quand vous vous exposez au soleil.</p>	<p>Contactez votre équipe de soins de santé si pas d'amélioration ou grave.</p>

Vous pouvez consulter la version la plus récente de cette fiche à la page <https://www.cancercareontario.ca/fr/drugs>

Vous trouverez de plus amples renseignements sur le traitement des symptômes à la page <https://www.cancercareontario.ca/fr/symptomes>

Ressources créées par l'équipe chargée du formulaire des médicaments de CCO, avec l'avis de l'équipe de formation des patients et des conseillers des patients et des familles.

Effets secondaires et que faire	Quand contacter un médecin?
<b>Effets Secondaires Moins Courants (10-24 sur 100 personnes)</b>	
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Essayez le plus possible d'éviter de vous exposer au soleil.</li> <li>• Appliquez un écran solaire comportant une protection contre les UVA et les UVB et un FPS d'au moins 30.</li> <li>• Utilisez un baume et un écran solaire pour vos lèvres.</li> <li>• Quand vous êtes au soleil, portez une chemise à manches longues, un pantalon et un chapeau pour vous protéger.</li> <li>• Appliquez un produit hydratant sur votre peau.</li> </ul>	
<p><b>Toux, essoufflement</b></p> <p>Vous pourrez présenter une toux et vous sentir essoufflé sans aucun signe d'infection, par exemple des maux de gorge ou une congestion nasale.</p>	<p>Contactez votre équipe de soins de santé si pas d'amélioration ou grave.</p>
<p><b>Brûlements ou maux d'estomac</b></p> <p><b>Pour aider à prévenir les brûlements ou maux d'estomac :</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Évitez les aliments gras ou épicés.</li> <li>• Évitez de vous étendre après avoir mangé.</li> <li>• Buvez des liquides clairs et prenez de petits repas.</li> </ul>	<p>Contactez votre équipe de soins de santé si pas d'amélioration ou grave.</p>
<p><b>Saignements ou bleus inhabituels</b></p> <p>Vous pouvez avoir des selles noires, des crachements de sang, des points mauves (bleus) ou rouges sur la peau ou des saignements qui ne cessent pas.</p> <p><b>Fièvre, frissons, infection</b></p> <p>Vous avez de la fièvre si votre température prise par la bouche (température buccale) est :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>38.3 ° C (100.9 °F) ou plus à tout moment OU</b></li> <li>• <b>38.0 ° C (100.4 °F) ou plus pendant au moins une heure</b></li> </ul> <p>Pendant que vous recevez des traitements de chimiothérapie :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Gardez un thermomètre digital à la maison et prenez votre température si vous vous sentez fiévreux ou si vous ne vous sentez pas bien (par exemple si vous avez des frissons).</li> <li>• Évitez de prendre des médicaments qui suppriment la fièvre avant de prendre votre température (par exemple: Tylenol<sup>MD</sup>, acétaminophène, Advil<sup>MD</sup> ou ibuprofène) car ils peuvent dissimuler une fièvre.</li> </ul>	<p>Obtenez des soins médicaux d'urgence sans délai.</p>

Vous pouvez consulter la version la plus récente de cette fiche à la page <https://www.cancercareontario.ca/fr/drugs>

Vous trouverez de plus amples renseignements sur le traitement des symptômes à la page <https://www.cancercareontario.ca/fr/symptomes>

Ressources créées par l'équipe chargée du formulaire des médicaments de CCO, avec l'avis de l'équipe de formation des patients et des conseillers des patients et des familles.

Effets secondaires et que faire	Quand contacter un médecin?
<b>Effets Secondaires Moins Courants (10-24 sur 100 personnes)</b>	
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Ne mangez ou ne buvez rien de chaud ou de froid immédiatement avant de prendre votre température.</li> <li>• Lavez-vous souvent les mains.</li> <li>• Consultez votre médecin avant tout vaccin, chirurgie, procédure médicale ou avant d’aller chez le dentiste.</li> </ul> <p><b>Parlez à votre équipe de soins de santé ou rendez-vous à la salle d'urgence la plus proche si vous faites de la fièvre.</b> Pour plus d'informations, consultez la fiche <a href="#">Neutropénie (faible taux de neutrophiles)</a>.</p>	

**D'autres effets secondaires rares sont possibles. Si vous avez L'UN OU L'AUTRE des effets suivants, vous devez parler à votre équipe de soins de santé ou recevoir immédiatement des soins médicaux d'urgence:**

- soudaine perte de la vue, troubles de la parole ou difficultés à bouger les bras ou les jambes;
- douleurs thoraciques ou dans le bras, essoufflement;
- douleur sévère soudaine dans le haut du dos, qui monte dans votre cou ou descend dans votre dos alors que vous ne vous êtes pas blessé;
- faiblesse d'un côté du corps;
- douleurs, gonflement ou durcissement dans le bras ou la jambe;
- palpitations inhabituelles au niveau de la poitrine ou du ventre;
- évanouissements ou gonflement dans les jambes, les chevilles ou l'abdomen;
- douleurs soudaines et intenses à l'abdomen ou dans la région de l'estomac, difficulté à avaler;
- douleurs au milieu de l'abdomen pouvant se propager au dos;
- difficultés respiratoires ou présence de sang dans la toux, voix rauque ou éraillée;
- perte de la vue ou vision trouble;
- maux de tête intenses, évanouissements, convulsions;
- plaies qui cicatrisent lentement ou qui ne cicatrisent pas complètement

## Qui joindre si j'ai des questions ou besoin d'aide?

Mon fournisseur de soins de santé de cancérologie est : \_\_\_\_\_

Pendant la journée, je dois joindre : \_\_\_\_\_

En soirée, fin de semaine et durant les jours fériés  
: \_\_\_\_\_

### Autres remarques :

---



---



---



---



---



---



---



---



---



---

### August 2023 Updated Side effects section (Mise à jour de la section « Effets secondaires »)

*Les renseignements présentés dans les fiches d'information sur les médicaments, les fiches d'information sur les régimes et les renseignements à l'intention des patients pour le traitement des symptômes figurant dans le Formulaire pharmaceutique (le "Formulaire") ne sont offerts aux spécialistes de la santé et aux patients qu'à des fins d'information. Ces données ne visent pas à couvrir l'ensemble des utilisations, instructions, précautions, interactions médicamenteuses ou effets secondaires d'un médicament en particulier, et ne doivent pas servir à indiquer qu'une utilisation particulière d'un médicament est sans danger, approprié ou efficace pour un trouble de santé donné.*

*Les patients doivent toujours consulter un fournisseur de soins de santé s'ils ont des questions touchant l'information présentée dans le Formulaire. L'information du Formulaire ne vise pas à fournir ou remplacer une consultation médicale et ne doit pas servir à cette fin. L'utilisation du Formulaire doit être assujettie à une opinion clinique et les régimes prescrits peuvent ne pas concorder avec l'information du Formulaire.*

Vous pouvez consulter la version la plus récente de cette fiche à la page <https://www.cancercareontario.ca/fr/drugs>

Vous trouverez de plus amples renseignements sur le traitement des symptômes à la page <https://www.cancercareontario.ca/fr/symptomes>

Ressources créées par l'équipe chargée du formulaire des médicaments de CCO, avec l'avis de l'équipe de formation des patients et des conseillers des patients et des familles.

août 2023

Page 10 of 10