

## Fiche d'information sur les médicaments

**vinCRISStine** (vin-cris-ti-ne)

*Ce document fournit des renseignements généraux à propos de votre médicament. Il ne remplace pas les conseils de votre équipe de spécialistes des soins de santé. Vous devez toujours discuter de votre traitement avec votre spécialiste des soins de santé et consulter la notice d'accompagnement du produit pour plus de détails.*

**Autre nom(s):** Oncovin<sup>MD</sup>

**Présentation:** Solution transparente incolore qui peut être mélangée dans de plus grands sacs de liquide.

**Pourquoi ce médicament est-il utilisé?**

- Pour le traitement de la leucémie, des lymphomes, des sarcomes et moins fréquemment d'autres formes de cancer, généralement en association à d'autres médicaments.

**Qu'est-ce que je dois faire avant d'avoir ce médicament?**

- Dites à votre médecin si vous avez ou avez eu des troubles de santé importants, plus particulièrement en particulier si vous avez/avez eu des problèmes de foie ou de nerfs (p. ex. engourdissement ou de picotement dans les doigts et les orteils), ou si vous avez des allergies.
- Les personnes atteintes d'un cancer sont exposées à un risque élevé d'apparition d'autres formes de cancer (généralement quelques années plus tard) ou de caillots sanguins. Certains médicaments administrés contre le cancer peuvent accroître ces risques, surtout s'ils sont administrés pendant une période prolongée. Vous devriez discuter avec votre médecin de vos préoccupations à propos de ce médicament.

**Comment ce médicament affecte-t-il les relations sexuelles, la grossesse et l'allaitement?**

- vinCRISStine peut être nocif pour le fœtus; vous ne devez pas utiliser ce médicament si vous êtes enceinte.
- S'il y a DES RISQUES que vous-même ou votre partenaire deveniez enceinte, ensemble vous-même et votre partenaire devez: ► **Utiliser deux méthodes efficaces de contraception simultanément** pendant la prise de ce médicament. Vous devez continuer à utiliser des méthodes contraceptives jusqu'à **six mois** après la dernière dose (recommandation générale). Parlez-en avec votre équipe de soins de santé.
- Si vous-même ou votre partenaire devenez enceinte, dites-le immédiatement à votre médecin.
- Vous ne devez pas allaiter pendant le traitement avec vincristine.
- Effets sur la fertilité: Probable

## Comment ce médicament est-il donné?

- Ce médicament est seulement administré par injection dans une veine.

## Qu'est-ce que je dois savoir de plus lorsque je prends ce médicament?

- Vous ne devez manger ou boire de fruits, de jus ou de produits dérivés de pamplemousses, caramboles ou oranges de Séville pendant votre traitement pour ne pas accroître les effets secondaires.
- Ce médicament peut interagir avec d'autres médicaments et réduire l'efficacité du traitement ou provoquer des effets secondaires graves.
- Assurez-vous que votre équipe de soins de santé connaisse tous vos médicaments (avec ou sans ordonnance, herbes médicinales et suppléments). Avant de commencer à prendre un médicament ou de cesser de le faire, parlez-en à votre équipe de soins de santé.

## Quels sont les effets secondaires de ce médicament?

Les effets secondaires suivants sont courants ou graves. Vous n'éprouverez peut-être pas tous ces effets secondaires. D'autres effets secondaires peuvent survenir. Si vous présentez des effets secondaires inhabituels ou qui vous incommode, parlez-en à votre médecin.

Effets secondaires et que faire	Quand contacter un médecin?
<b>Effets Secondaires les Plus Courants</b>	
<p><b><i>Amincissement ou perte des cheveux</i></b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Utilisez une brosse souple et douce; éviter les fixatifs, les décolorants, les teintures et les permanentes.</li> <li>• Vos cheveux repousseront habituellement après la fin du traitement, mais la texture ou la couleur pourrait changer.</li> </ul>	
<p><b><i>Constipation</i></b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Adopter une alimentation équilibrée avec des fibres comme des grains entiers, des fruits et des légumes crus.</li> <li>• Boire beaucoup de liquides et essayer l'exercice léger régulièrement.</li> <li>• Consulter votre médecin si vous n'avez pas été à la selle depuis 3 jours ou plus.</li> <li>• Voir aussi le dépliant sur la Constipation.*</li> </ul>	<p>Contactez votre médecin si grave ou pas d'amélioration</p>

Vous pouvez consulter les versions les plus récentes et vous procurer des renseignements complémentaires sur le traitement des symptômes à l'adresse: <http://www.cancercare.on.ca/informed>

Préparé avec la collaboration du Groupe de travail sur les Fiches d'information sur les médicaments de Action Cancer Ontario.

April 2016

Effets secondaires et que faire	Quand contacter un médecin?
<b>Effets Secondaires les Plus Courants</b>	
<p><b>Nausées et vomissements</b> (généralement légers)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Buvez des liquides clairs et évitez les gros repas. Respirer de l'air frais et se reposer.</li> <li>• Évitez les aliments épicés et frits, ou les aliments dont l'odeur est forte.</li> <li>• Prenez des antinauséux exactement comme l'a indiqué votre médecin. Il est plus facile de prévenir les nausées que les traiter.</li> <li>• Si les nausées persistent pendant plus de 48 heures ou les vomissements pendant plus de 24 heures, communiquez avec votre médecin.</li> <li>• Voyez également le dépliant sur les Nausées et vomissements.*</li> </ul>	<p>Contactez votre médecin si grave ou pas d'amélioration</p>
<p><b>Picotement ou engourdissement des orteils ou des doigts</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Peuvent revenir lentement à la normale après la fin du traitement.</li> <li>• Communiquez avec le médecin ou l'infirmière si vous avez du mal à attacher des boutons, à écrire, à prendre de petits objets, si vous éprouvez de la douleur, ou bien des ennuis avec le mouvement.</li> <li>• Les effets indésirables qui ne sont pas si courant inclure les effets de nerfs dans la tête/visage, qui peuvent entraîner la faiblesse ou provoquer des changements dans les sens comme l'audition – Contacter votre médecin si ces effets se produisent.</li> </ul>	<p>Contactez votre médecin si grave ou pas d'amélioration</p>

Effets secondaires et que faire	Quand contacter un médecin?
<b>Effets Secondaires Moins Courants, mais peuvent être Sévères</b>	
<p><b>Problèmes pulmonaires</b> (toux accrue, difficulté à respirer, douleurs thoraciques, crachement de sang)</p>	<p>Obtenez soins médicaux d'urgence sans délai</p>
<p><b>Rupture de l'estomac ou de la paroi intestinale</b> (Douleur soudaine et intense au ventre ou à proximité de l'estomac)</p>	<p>Obtenez soins médicaux d'urgence sans délai</p>
<p><b>Problèmes d'audition ou la perte d'audition</b></p>	<p>Contactez votre médecin dès que possible (heures de bureau)</p>

Effets secondaires et que faire	Quand contacter un médecin?
<b>Effets Secondaires Moins Courants, mais peuvent être Sévères</b>	
<p><b>Réaction allergique</b> (fièvre, importantes éruptions cutanées, démangeaisons, enflure du visage, des lèvres ou de la langue, serrement à la poitrine ou à la gorge; peut survenir pendant ou peu de temps après l'administration du médicament)</p>	<p>Obtenez soins médicaux d'urgence sans délai</p>
<p><b>Saignements ou bleus inhabituels</b></p> <p>Vous pouvez avoir des selles noires, des crachements de sang, des points mauves (bleus) ou rouges sur la peau ou des saignements qui ne cessent pas.</p> <p><b>Fièvre, frissons, infection</b></p> <p>Vous avez de la fièvre si votre température prise par la bouche (température buccale) est :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>38.3 ° C (100.9 °F) ou plus à tout moment OU</b></li> <li>• <b>38.0 ° C (100.4 °F) ou plus pendant au moins une heure</b></li> </ul> <p>Pendant que vous recevez des traitements de chimiothérapie :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Gardez un thermomètre digital à la maison et prenez votre température si vous vous sentez fiévreux ou si vous ne vous sentez pas bien (par exemple si vous avez des frissons).</li> <li>• Évitez de prendre des médicaments qui suppriment la fièvre avant de prendre votre température (par exemple: Tylenol™, acétaminophène, Advil™ ou ibuprofène) car ils peuvent dissimuler une fièvre.</li> <li>• Ne mangez ou ne buvez rien de chaud ou de froid immédiatement avant de prendre votre température.</li> <li>• Lavez-vous souvent les mains.</li> <li>• Consultez votre médecin avant tout vaccin, chirurgie ou avant d'aller chez le dentiste.</li> </ul> <p><b>Parlez à votre équipe de soins de santé ou rendez-vous à la salle d'urgence la plus proche si vous faites de la fièvre.</b> Pour plus d'informations, consultez la fiche «<a href="#">Neutropénie (Baisse du nombre de globules blancs)</a> ».</p>	<p>Obtenez soins médicaux d'urgence sans délai</p>
<p><b>La douleur, la brûlure, la rougeur, ou l'enflure sur la peau où le médicament a été injecté</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Mentionnez ces signes immédiatement à l'équipe soignante dès qu'ils surviennent</b>, puisque le médicament peut endommager ou irriter les tissus s'il s'écoule de la veine pendant l'injection.</li> </ul>	

Effets secondaires et que faire	Quand contacter un médecin?
<b>Effets Secondaires Moins Courants, mais peuvent être Sévères</b>	
<b>Les faibles taux de sel mesurés dans le sang peuvent entraîner une légère confusion ou une enflure</b>	Obtenez soins médicaux d'urgence sans délai
<b>Le fait de tuer des cellules cancéreuses rapidement au commencement du traitement peut mener à une accumulation de déchets cellulaires</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Si elle est légère, elle peut causer la goutte, avec des douleurs articulaires, mais si elle est marquée, elle peut causer de la fièvre, une insuffisance rénale et de la confusion, et être potentiellement mortelle.</li> <li>• Vous DEVEZ prendre les médicaments prescrits à titre préventif par votre médecin ET</li> <li>• Boire beaucoup de liquides (6 à 8 verres par jour) et uriner fréquemment.</li> </ul>	Obtenez soins médicaux d'urgence sans délai

*Les renseignements présentés dans les fiches d'information sur les médicaments, les fiches d'information sur les régimes et les renseignements à l'intention des patients pour le traitement des symptômes figurant dans le Formulaire pharmaceutique (le "Formulaire") ne sont offerts aux spécialistes de la santé et aux patients qu'à des fins d'information. Ces données ne visent pas à couvrir l'ensemble des utilisations, instructions, précautions, interactions médicamenteuses ou effets secondaires d'un médicament en particulier, et ne doivent pas servir à indiquer qu'une utilisation particulière d'un médicament est sans danger, approprié ou efficace pour un trouble de santé donné.*

*Les patients doivent toujours consulter un fournisseur de soins de santé s'ils ont des questions touchant l'information présentée dans le Formulaire. L'information du Formulaire ne vise pas à fournir ou remplacer une consultation médicale et ne doit pas servir à cette fin. L'utilisation du Formulaire doit être assujettie à une opinion clinique et les régimes prescrits peuvent ne pas concorder avec l'information du Formulaire.*