

vorasidenib

Autre nom(s): Voranigo^{MC}

Présentation: comprimé

Cette circulaire vous offre des renseignements à propos de ce médicament contre le cancer.

Vous apprendrez :

- Où obtenir de l'aide
- Ce qu'est le médicament
- Comment il est administré
- Ce à quoi vous attendre pendant le traitement



Cette circulaire a été créée par Santé Ontario (Action Cancer Ontario) en collaboration avec des patients qui ont déjà suivi un traitement contre leur cancer, et leurs aidants. Elle doit servir de ressource pour vous aider pendant votre traitement contre le cancer et répondre à certaines de vos questions.

**Ces renseignements ne remplacent pas l'avis de votre équipe de soins de santé.
Communiquez toujours avec votre équipe de soins de santé à propos de votre traitement.**

Qui joindre si j'ai des questions ou besoin d'aide?

Mon fournisseur de soins de cancérologie est : _____

Pendant la journée, je dois m'adresser à : _____

Soirs, fins de semaine et jours fériés : _____

Pourquoi ce traitement est-il utilisé?

Le vorasidenib est utilisé pour traiter certains types de cancer du cerveau appelés astrocytome ou oligodendrogliome.

Qu'est-ce que je dois faire avant de recevoir ce traitement?

Signalez à votre équipe de soins de santé tout problème de santé important que vous avez (eu), en particulier si vous avez (eu) :

- des problèmes rénaux, hépatiques ou
- des allergies.

Les comprimés de vorasidenib contiennent une petite quantité de lactose. Signalez à votre équipe de soins de santé toute intolérance au lactose.



N'oubliez pas de :

- ✓ Parler à votre équipe de soins de santé de tous les autres médicaments que vous prenez.
- ✓ Continuer à prendre les autres médicaments qui vous ont été prescrits, sauf indication contraire de votre équipe de soins de santé.

Vous aurez un test sanguin pour détecter l'hépatite B avant de commencer le traitement. Consultez la brochure [Médicaments contre l'hépatite B et le cancer](#) pour plus d'informations.

Comment ce traitement est-il administré?

- Ce médicament se prend généralement une fois par jour par voie orale. Discutez avec votre équipe de soins de santé de la façon et du moment de prendre vos médicaments.
- Prenez le vorasidenib entier, avec un grand verre d'eau, à jeun, au moins une heure avant ou deux heures après le repas.
- N'écrasez ni ne mâchez les comprimés de vorasidenib.
- Si vous oubliez de prendre une dose de votre vorasidenib :
 - ◊ Si moins de 6 heures se sont écoulées depuis la dose oubliée, prenez la dose comme d'habitude. Prenez ensuite votre prochaine dose à l'heure habituelle.
 - ◊ Si plus de 6 heures se sont écoulées, ne prenez pas la dose. Prenez votre prochaine dose à l'heure habituelle. Ne prenez pas de dose supplémentaire (ne doublez pas la dose) pour compenser la dose oubliée.
- Si vous vomissez après avoir pris votre médicament, parlez-en à votre équipe de soins de santé pour savoir quoi faire.

Mise en garde: Si vous prenez trop de ce médicament, par accident, ou si vous soupçonnez un enfant ou un animal de compagnie d'avoir ingéré votre médicament, appelez immédiatement le centre antipoison de l'Ontario au 1-800-268-9017.

À FAIRE pendant le traitement



- ✓ VÉRIFIEZ auprès de votre équipe de soins de santé avant de vous faire vacciner, subir une intervention chirurgicale, des soins dentaires ou tout autre acte médical.

À NE PAS FAIRE pendant le traitement



- × NE PRENEZ AUCUN autre médicament, comme des vitamines, des médicaments ou substances en vente libre (sans ordonnance), ou des produits de santé naturels sans consulter votre équipe de soins de santé.
- × NE COMMENCEZ AUCUNE thérapie complémentaire ou alternative, comme l'acupuncture ou les produits homéopathiques, sans consulter votre équipe de soins de santé.
- × N'UTILISEZ PAS de produits du tabac (tels que les cigarettes ou les cigarettes électroniques) et NE CONSOMMEZ PAS d'alcool pendant le traitement sans en parler au préalable à votre équipe de soins de santé. Fumer et boire peuvent aggraver les effets secondaires et réduire l'efficacité du traitement.

Ce traitement interagira-t-il avec d'autres médicaments ou produits de santé naturels?

Oui, ce médicament peut interagir avec d'autres médicaments, vitamines, aliments, médicaments traditionnels et produits de santé naturels. Les interactions pourraient réduire l'efficacité du traitement et causer de graves effets secondaires.

Parlez à votre équipe de soins de santé de tous vos :

- médicaments délivrés sur ordonnance et en vente libre (vendus sans ordonnance);
- autres drogues et substances, comme le cannabis/la marijuana (à titre médical ou récréatif);
- produits de santé naturels tels que les vitamines, les tisanes, les médicaments homéopathiques et les autres compléments, ou les médicaments traditionnels.

Consultez votre équipe de soins de santé avant de commencer ou d'arrêter l'usage de l'un de ces produits.



Consultez votre équipe de soins de santé **AVANT** de prendre l'un de ces produits :

- Médicaments anti-inflammatoires tels que l'ibuprofène (Advil^{MD} ou Motrin^{MD}), le naproxène (Aleve^{MD}) ou l'aspirine
- Produits en vente libre tels que le dimenhydrinate (Gravol^{MD})
- Produits de santé naturels comme le millepertuis perforé
- Médicaments traditionnels
- Suppléments comme la vitamine C
- Jus de pamplemousse
- Boissons alcoolisées
- Tabac
- Toutes les autres drogues et substances, telles que la marijuana ou cannabis (médicale ou récréative)

Que dois-je faire si je me sens mal, si j'ai des douleurs, des maux de tête ou de la fièvre?

- ✓ Prenez **toujours** votre température pour savoir si vous avez de la fièvre **avant** de prendre des médicaments pour la fièvre ou la douleur (comme l'acétaminophène (TylenolMD) ou l'ibuprofène (AdvilMD)).
 - ◊ La fièvre peut être un signe d'infection pouvant nécessiter un traitement immédiat.
 - ◊ Si vous prenez ces médicaments avant de vérifier si vous avez de la fièvre, ils pourraient faire baisser votre température et vous pourriez ne pas savoir si vous avez une infection.

Comment vérifier si vous avez de la fièvre :

Gardez un thermomètre numérique (électronique) chez vous et prenez votre température si vous avez l'impression d'être chaud ou vous ne vous sentez pas bien (p. ex. frissons, maux de tête, douleur légère).

- Vous avez de la fièvre si votre **température orale (prise dans la bouche)** est de :
 - ◊ 38,3 °C (100,9 °F) ou plus en tout temps

OU

 - ◊ 38 °C (100,4 °F) ou plus pendant au moins une heure.



Si vous avez de la fièvre :

- ✓ **Essayez de communiquer avec votre équipe de soins de santé. Si vous n'êtes pas en mesure de joindre l'équipe pour obtenir des conseils, vous DEVEZ immédiatement obtenir une aide médicale d'urgence.**
- ✓ Demandez à votre équipe de soins de santé de vous fournir la brochure sur la [fièvre](#) pour de plus amples renseignements.

Si vous n'avez pas de fièvre, mais que vous avez de légers symptômes comme des maux de tête ou une douleur légère :

- ✓ Demandez à votre équipe de soins de santé quel est le bon traitement pour vous.

L'acétaminophène (Tylenol^{MD}) est un choix sécuritaire pour la plupart des gens.



Parlez à votre équipe de soins de santé avant de prendre de l'ibuprofène (Advil^{MD}, Motrin^{MD}), du naproxène (Aleve^{MD}) ou de l'acide acétylsalicylique (Aspirin^{MD}). Ces médicaments pourraient augmenter les risques de saignements ou interagir avec votre traitement contre le cancer.



Parlez-en à votre équipe de soins de santé si vous prenez déjà une **faible dose d'aspirine** pour un problème médical (comme un trouble cardiaque). Il pourrait être pris en toute sécurité.

Comment ce traitement influe-t-il sur la vie sexuelle, la grossesse et l'allaitement?

Discutez des points suivants avec votre équipe de soins de santé :

- Comment ce traitement peut affecter votre santé sexuelle
- Comment ce traitement peut-il affecter votre capacité à avoir un enfant, si cela s'applique à vous

Ce traitement peut être nocif pour un enfant à naître. Parlez-en à votre équipe de soins de santé si vous (ou votre partenaire) êtes enceinte, tombez enceinte pendant le traitement, ou si vous allaitez.

- S'il y a le **moindre** risque de grossesse, vous et votre partenaire devez utiliser simultanément **deux méthodes contraceptives efficaces** durant votre traitement et au moins jusqu'à **3 mois** après votre dernière dose de traitement. Demandez à votre équipe de soins de santé quelle est la meilleure méthode contraceptive pour vous.
- Ce médicament peut réduire l'efficacité de la contraception hormonale, comme la pilule contraceptive. Si vous décidez d'utiliser une méthode de contraception hormonale, pensez à utiliser également une méthode de contraception mécanique ou non hormonale (comme les préservatifs). Demandez à votre équipe de soins de santé quelle est la meilleure méthode contraceptive pour vous.
- N'allaitez pas durant ce traitement et pendant un délai de **2 mois** après la prise de la dernière dose.

Comment dois-je conserver et manipuler les médicaments de ce traitement en toute sécurité?

- Conservez les comprimés de vorasidenib dans leur emballage d'origine à température ambiante dans un endroit sec, à l'abri de la chaleur et de la lumière.
- Tenez hors de la vue et de la portée des enfants et des animaux domestiques.
- Ne jetez pas les comprimés de vorasidenib non utilisés que vous avez chez vous. Apportez-les à votre pharmacie pour qu'ils soient éliminés en toute sécurité.

Comment toucher votre médicament oral contre le cancer en toute sécurité?

Si vous êtes un patient :

- Lavez-vous les mains avant et après avoir touché vos médicaments contre le cancer administrés par voie orale.
- Avalez chaque comprimé en entier. N'écrasez pas et ne mâchez pas les comprimés.

Si vous êtes un aidant :

- Portez des gants en nitrile ou en latex lorsque vous manipulez des comprimés, des capsules ou des liquides.
- Lavez-vous les mains avant de mettre vos gants et après les avoir enlevés, même si votre peau n'a pas touché le médicament.
- Jetez vos gants après chaque utilisation. Ne réutilisez pas les gants.
- Ne touchez pas les médicaments oraux contre le cancer si vous êtes enceinte ou que vous allaitez.

Que faire si le médicament entre en contact avec votre peau ou vos yeux?

En cas de contact avec la peau :

- Lavez votre peau avec beaucoup d'eau et de savon.
- Si votre peau rougit ou devient irritée, parlez-en à votre équipe de soins de santé.

En cas de contact avec les yeux :

- Rincez immédiatement vos yeux à grande eau. Laissez l'eau s'écouler sur vos yeux ouverts pendant au moins 15 minutes.

Quels sont les effets secondaires de ce traitement?

Le tableau suivant répertorie les effets secondaires que vous pourriez ressentir lors de la prise de vorasidenib. Le tableau est conçu pour lister en premier les effets secondaires les plus fréquents et en dernier les moins fréquents. Il est peu probable que vous présentiez tous les effets secondaires mentionnés, et vous pourriez en présenter certains qui ne sont pas mentionnés.

Lisez attentivement le tableau des effets secondaires afin de savoir ce à quoi vous devez faire attention et quand demander de l'aide. Consultez ce tableau si vous ressentez des effets secondaires pendant votre traitement par le vorasidenib.

Effets secondaires courants (25 à 49 personnes sur 100)	
Effet secondaire et mesure à prendre	Quand communiquer avec l'équipe de soins de santé
<p>Problèmes hépatiques</p> <p>(Peuvent être graves)</p> <p>Votre équipe de soins de santé pourra vérifier votre fonction hépatique au moyen d'une analyse de sang. Les modifications hépatiques ne provoquent généralement aucun symptôme.</p> <p>Que faut-il rechercher?</p> <ul style="list-style-type: none"> • Plus rarement, vous pourriez développer une coloration jaunâtre de la peau ou des yeux, des urines anormalement foncées ou une douleur du côté droit de l'abdomen. Cela peut être grave. <p>Que faut-il faire?</p> <p>Si vous présentez des symptômes de problèmes hépatiques, obtenez immédiatement une aide médicale d'urgence.</p>	<p>Obtenez immédiatement une aide médicale d'urgence.</p>

Effets secondaires moins courants (10 à 24 personnes sur 100)	
Effet secondaire et mesure à prendre	Quand communiquer avec l'équipe de soins de santé
<p>Fatigue</p> <p>Que faut-il rechercher?</p> <ul style="list-style-type: none"> • Sensation de fatigue ou de manque d'énergie qui dure longtemps et ne disparaît pas avec le repos ou le sommeil. <p>Que faut-il faire?</p> <ul style="list-style-type: none"> • Soyez actif. Essayez de faire 30 minutes d'exercice modéré (vous permettant de parler confortablement pendant l'exercice) la plupart des jours. • Consultez votre équipe de soins de santé avant de commencer tout nouvel exercice. • Allez-y à votre rythme, ne vous précipitez pas. Reportez les activités moins importantes. Reposez-vous quand vous en avez besoin. • Demandez à votre famille ou à vos amis de vous aider pour les tâches ménagères, les courses et les soins aux enfants ou aux animaux de compagnie. • Mangez sainement et buvez au moins 6 à 8 verres d'eau ou d'autres liquides chaque jour (sauf si votre équipe de soins de santé vous a indiqué d'en boire plus ou moins). • Évitez de conduire ou d'utiliser des machines si vous vous sentez fatigué. <p>Demandez à votre équipe de soins de santé la brochure sur la fatigue pour plus d'informations.</p>	<p>Parlez-en à votre équipe de soins de santé si votre état ne s'améliore pas ou s'il est grave.</p>

Effets secondaires moins courants (10 à 24 personnes sur 100)	
Effet secondaire et mesure à prendre	Quand communiquer avec l'équipe de soins de santé
<p>Diarrhée</p> <p>Que faut-il rechercher?</p> <ul style="list-style-type: none"> • Des selles molles, liquides et non formées peuvent survenir quelques jours, voire quelques semaines, après votre traitement. <p>Que faut-il faire?</p> <p>Si vous avez la diarrhée :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Prenez des médicaments antidiarrhéiques si votre équipe de soins de santé vous les a prescrits ou vous a dit de les prendre. • Ne consommez pas d'aliments ou de boissons contenant des édulcorants artificiels (comme le chewing-gum ou les boissons « light »), ni de café ou d'alcool, jusqu'à ce que votre diarrhée ait cessé. • Privilégiez plusieurs petits repas et collations plutôt que 2 ou 3 gros repas. • Buvez au moins 6 à 8 tasses de liquide par jour, sauf si votre équipe de soins de santé vous a indiqué d'en boire plus ou moins. • Parlez-en à votre équipe de soins de santé si vous ne pouvez pas boire 6 à 8 tasses de liquide par jour lorsque vous avez la diarrhée. Vous pourriez avoir besoin de boire des liquides spéciaux contenant du sel et du sucre, appelés thérapie de réhydratation orale. • Parlez-en à votre équipe de soins de santé si votre diarrhée ne s'améliore pas après 24 heures de prise de médicaments contre la diarrhée ou si vous avez la diarrhée plus de 7 fois en une journée. <p>Demandez à votre équipe de soins de santé la brochure sur la diarrhée pour plus d'informations.</p>	<p>Parlez-en à votre équipe de soins de santé si aucune amélioration n'est constatée après 24 heures de prise de médicaments contre la diarrhée ou si les symptômes sont graves (plus de 7 fois en une journée).</p>

