

zolbétuximab

Prononciation: ZOL-beh-TUK-sih-mab

Autre nom(s): Vyloy^{MD}

Présentation: Médicament mélangé dans de plus grands sacs de liquide

Cette circulaire vous offre des renseignements à propos de ce médicament contre le cancer.

Vous apprendrez :

- Où obtenir de l'aide
- Ce qu'est le médicament
- Comment il est administré
- Ce à quoi vous attendre pendant le traitement



Cette circulaire a été créée par Santé Ontario (Action Cancer Ontario) en collaboration avec des patients qui ont déjà suivi un traitement contre leur cancer, et leurs aidants. Elle doit servir de ressource pour vous aider pendant votre traitement contre le cancer et répondre à certaines de vos questions.

**Ces renseignements ne remplacent pas l'avis de votre équipe de soins de santé.
Communiquez toujours avec votre équipe de soins de santé à propos de votre traitement.**

Qui joindre si j'ai des questions ou besoin d'aide?

Mon fournisseur de soins de cancérologie est : _____

Pendant la journée, je dois m'adresser à : _____

Soirs, fins de semaine et jours fériés : _____

Pourquoi ce traitement est-il utilisé?

Le zolbétuximab est utilisé pour traiter certains types de cancers de l'estomac.

Il est habituellement administré avec d'autres médicaments.

Qu'est-ce que je dois faire avant de recevoir ce traitement?

Informez votre équipe de soins de santé si vous souffrez ou avez déjà souffert de problèmes de santé importants, notamment :

- des problèmes hépatiques ou rénaux;
- des nausées ou vomissements récents;
- des allergies.



N'oubliez pas de :

- ✓ Parler à votre équipe de soins de santé de tous les autres médicaments que vous prenez.
- ✓ Continuer à prendre les autres médicaments qui vous ont été prescrits, sauf indication contraire de votre équipe de soins de santé.

Vous aurez un test sanguin pour détecter l'hépatite B avant de commencer le traitement. Consultez la brochure [Médicaments contre l'hépatite B et le cancer](#) pour plus d'informations.

Comment ce traitement est-il administré?

Ce médicament est administré par voie intraveineuse (injecté dans une veine). Communiquez avec votre équipe de soins de santé pour connaître le calendrier de votre traitement.

Si vous avez manqué votre rendez-vous pour recevoir le traitement, communiquez avec votre équipe de soins de santé pour connaître la marche à suivre.

Autres médicaments qui pourraient être administrés avec ce traitement

Prévention des nausées et des vomissements

On vous donnera des médicaments pour prévenir l'apparition de nausées (envie de vomir) et de vomissements.

- Il s'agit de médicaments antinauséeux, comme l'ondansétron (Zofran^{MD}), le gransétron (Kytril^{MD}), l'aprépitant (Emend^{MD}), l'olanzapine (Zyprexa®), ou d'autres produits.

À FAIRE pendant le traitement



- ✓ CONSULTEZ votre équipe de soins de santé avant de vous faire vacciner ou opérer, avant de recevoir des soins dentaires ou avant toute autre intervention médicale.
- ✓ PENSEZ À DEMANDER à quelqu'un de vous conduire à l'hôpital puis de vous ramener chez vous les jours de traitement. Vous pourriez ressentir une somnolence ou des étourdissements après votre traitement.

À NE PAS FAIRE pendant le traitement



- ✗ NE PRENEZ PAS d'autres médicaments, comme des vitamines, des médicaments en vente libre (sans ordonnance) ou des substances, ou bien des produits de santé naturels sans en parler à votre équipe de soins de santé.
- ✗ NE COMMENCEZ PAS de traitements complémentaires ou parallèles, comme l'acupuncture ou des produits homéopathiques sans en parler à votre équipe de soins de santé.
- ✗ N'UTILISEZ PAS de produits du tabac (comme les cigarettes ou les produits de vapotage) ou NE BUVEZ PAS d'alcool pendant votre traitement sans en avoir parlé à votre équipe de soins de santé. Le tabac et l'alcool peuvent aggraver les effets secondaires et réduire l'efficacité de votre traitement.

Ce traitement interagira-t-il avec d'autres médicaments ou produits de santé naturels?

Il est peu probable que ce médicament interagit avec d'autres médicaments, vitamines, aliments, médicaments traditionnels, et produits de santé naturels, mais informez votre équipe de soins de santé si vous prenez :

- des médicaments avec ou sans ordonnance,
- d'autres drogues et substances, comme le cannabis/la marijuana (à titre médical ou récréatif);
- des produits de santé naturels tels que les vitamines, les tisanes, les médicaments homéopathiques et les autres compléments, ou les médicaments traditionnels.

Consultez votre équipe de soins de santé avant de commencer ou d'arrêter l'usage de l'un de ces produits.



Consultez votre équipe de soins de santé AVANT de prendre l'un de ces produits :

- Médicaments anti-inflammatoires tels que l'ibuprofène (Advil^{MD} ou Motrin^{MD}), le naproxène (Aleve^{MD}) ou l'aspirine
- Produits en vente libre tels que le dimenhydrinate (Gravol^{MD})
- Produits de santé naturels comme le millepertuis perforé
- Médicaments traditionnels
- Suppléments comme la vitamine C
- Jus de pamplemousse
- Boissons alcoolisées
- Tabac
- Toutes les autres drogues et substances, telles que la marijuana ou cannabis (médicale ou récréative)

Que dois-je faire si je me sens mal, si j'ai des douleurs, des maux de tête ou de la fièvre?

- ✓ Prenez **toujours** votre température pour savoir si vous avez de la fièvre **avant** de prendre des médicaments pour la fièvre ou la douleur (comme l'acétaminophène (TylenolMD) ou l'ibuprofène (AdvilMD)).
 - La fièvre peut être un signe d'infection pouvant nécessiter un traitement immédiat.
 - Si vous prenez ces médicaments avant de vérifier si vous avez de la fièvre, ils pourraient faire baisser votre température et vous pourriez ne pas savoir si vous avez une infection.

Comment vérifier si vous avez de la fièvre :

Gardez un thermomètre numérique (électronique) chez vous et prenez votre température si vous avez l'impression d'être chaud ou vous ne vous sentez pas bien (p. ex. frissons, maux de tête, douleur légère).

- Vous avez de la fièvre si votre **température orale (prise dans la bouche)** est de :
 - 38,3 °C (100,9 °F) ou plus en tout temps
- OU
- 38 °C (100,4 °F) ou plus pendant au moins une heure.



Si vous avez de la fièvre :

- ✓ **Essayez de communiquer avec votre équipe de soins de santé. Si vous n'êtes pas en mesure de joindre l'équipe pour obtenir des conseils, vous DEVEZ immédiatement obtenir une aide médicale d'urgence.**
- ✓ Demandez à votre équipe de soins de santé de vous fournir la brochure sur la [fièvre](#) pour de plus amples renseignements.

Si vous n'avez pas de fièvre, mais que vous avez de légers symptômes comme des maux de tête ou une douleur légère :

- ✓ Demandez à votre équipe de soins de santé quel est le bon traitement pour vous.

L'acétaminophène (Tylenol^{MD}) est un choix sécuritaire pour la plupart des gens.



Parlez à votre équipe de soins avant de prendre de l'ibuprofène (Advil^{MD}, Motrin^{MD}), du naproxène (Aleve^{MD}) ou de l'acide acétylsalicylique (Aspirine^{MD}). Ces médicaments pourraient augmenter les risques de saignements ou interagir avec votre traitement contre le cancer.



Parlez-en à votre équipe de soins de santé si vous prenez déjà une **faible dose d'aspirine** pour un problème médical (comme un trouble cardiaque). Il pourrait être pris en toute sécurité.

Comment ce traitement influe-t-il sur la vie sexuelle, la grossesse et l'allaitement?

Communiquez avec votre équipe de soins de santé sur les sujets suivants :

- La façon dont ce traitement pourrait influer sur votre santé sexuelle.
- La façon dont ce traitement pourrait influer sur votre fertilité (capacité à concevoir un enfant), si cela s'applique à vous.

Ce traitement peut être nocif pour un enfant à naître. Parlez-en à votre équipe de soins de santé si vous (ou votre partenaire) êtes enceinte, tombez enceinte pendant le traitement, ou si vous allaitez.

- S'il y a le **moindre** risque de grossesse, vous et votre partenaire devez utiliser simultanément **deux méthodes contraceptives efficaces** durant votre traitement et au moins jusqu'à **six mois** après votre dernière dose de traitement. Demandez à votre équipe de soins de santé quelle est la meilleure méthode contraceptive pour vous.
- N'allaitez pas durant ce traitement et pendant un délai de **huit mois** après la prise de la dernière dose.

Quels sont les effets secondaires de ce traitement?

Le tableau suivant énumère les effets secondaires que vous pouvez observer lorsque vous prenez du zolbétuximab. Certains de ces effets secondaires peuvent également être causés par d'autres chimiothérapies administrées avec le zolbétuximab. Ce tableau les énumère des plus courants aux moins courants. Il est peu probable que vous ayez tous les effets secondaires énumérés et vous pourriez en avoir d'autres qui n'y sont pas recensés.

Lisez l'ensemble du tableau des effets secondaires pour connaître les symptômes auxquels vous devez prêter attention et pour connaître le moment de demander de l'aide. Consultez ce tableau si vous observez l'un de ces effets secondaires lorsque vous prenez du zolbétuximab.

Effets secondaires les plus courants (au moins 50 personnes sur 100)	
Effet secondaire et mesure à prendre	Quand communiquer avec l'équipe de soins de santé
<p>Nausées et vomissements (Ces symptômes peuvent être graves)</p> <p>Quels signes sont à surveiller?</p> <ul style="list-style-type: none"> La nausée est la sensation d'avoir envie de vomir. Vous pourriez également vous sentir étourdi. Vous pourriez avoir la nausée pendant les heures ou les jours suivant votre traitement. <p>Que faire?</p> <p>Pour prévenir la nausée :</p> <ul style="list-style-type: none"> Il est plus facile de prévenir la nausée que de la traiter. Si on vous a donné des médicaments antinauséeux, prenez-les selon ce qui a été prescrit, même si vous n'avez pas envie de vomir. Buvez des liquides clairs et prenez de petits repas légers. Prenez de l'air frais et reposez-vous. Ne mangez pas d'aliments épicés, frits, ou ayant une odeur forte. Limitez votre consommation de caféine (café, thé) et évitez l'alcool. 	Contactez votre équipe de soins de santé si la nausée persiste au-delà de 48 heures ou si les vomissements sont violents ou durent plus de 24 heures.

Effets secondaires les plus courants (au moins 50 personnes sur 100)	
Effet secondaire et mesure à prendre	Quand communiquer avec l'équipe de soins de santé
<p>En cas de nausée ou de vomissements :</p> <ul style="list-style-type: none"> Prenez vos médicaments antinauséeux (au besoin) selon ce qui a été prescrit. Pour obtenir de plus amples renseignements, demandez à votre équipe de soins de santé de vous fournir la brochure intitulée <u>Nausée et vomissements</u>. Parlez à votre équipe de soins de santé si : <ul style="list-style-type: none"> la nausée persiste au-delà de 48 heures; les vomissements sont violents ou durent plus de 24 heures. 	

Effets secondaires courants (25 à 49 personnes sur 100)	
Effet secondaire et mesure à prendre	Quand communiquer avec l'équipe de soins de santé
<p>Manque d'appétit</p> <p>Quels signes sont à surveiller?</p> <ul style="list-style-type: none"> Perte d'intérêt dans la nourriture ou absence de sensation de faim. Perte de poids. <p>Que faire?</p> <ul style="list-style-type: none"> Essayez de manger vos aliments préférés. Mangez de petits repas tout au long de la journée. Vous pourriez avoir besoin de prendre des suppléments alimentaires pour maintenir votre poids. Consultez votre équipe de soins de santé si vous n'avez pas d'appétit. <p>Pour obtenir de plus amples renseignements, demandez à votre équipe de soins de santé de vous fournir la brochure intitulée <u>Perte d'appétit</u>.</p>	Parlez-en à votre équipe de soins de santé si les symptômes sont intenses ou ne s'améliorent pas.

Effets secondaires courants (25 à 49 personnes sur 100)	
Effet secondaire et mesure à prendre	Quand communiquer avec l'équipe de soins de santé
<p>Faible nombre de neutrophiles (globules blancs) dans le sang (neutropénie)</p> <p>(Ces symptômes peuvent être graves)</p> <p>Lorsque votre nombre de neutrophiles est faible, vous courez un risque d'infection accru. Pour obtenir de plus amples renseignements, demandez à votre équipe de soins de santé de vous fournir la brochure intitulée Neutropénie (faible taux de globules blancs).</p> <p>Quels signes sont à surveiller?</p> <ul style="list-style-type: none"> • En cas de sensation de chaleur ou de malaise (p. ex., si vous avez des frissons ou que vous commencez à tousser), vous devez vérifier votre température pour déterminer si vous faites de la fièvre. • Ne prenez pas de médicaments qui font baisser la fièvre avant de prendre votre température (p. ex., Tylenol^{MD} [acétaminophène] ou Advil^{MD} [ibuprofène]). • Ne mangez pas et ne buvez rien de chaud ou froid juste avant de prendre votre température. <p>Vous faites de la fièvre si votre température orale (prise dans la bouche) est de :</p> <ul style="list-style-type: none"> • 38,3 °C (100,9 °F) ou plus en tout temps OU • 38 °C (100,4 °F) ou plus pendant au moins une heure. <p>Que faire?</p> <p>Si votre équipe de soins de santé vous a dit que vous aviez un faible taux de neutrophiles :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Lavez-vous les mains souvent pour prévenir les infections. • Consultez votre équipe de soins de santé avant toute vaccination, opération, intervention médicale ou visite chez le dentiste. • Gardez un thermomètre numérique à la maison pour pouvoir vérifier facilement si vous faites de la fièvre. 	<p>Si vous faites de la fièvre, essayez de communiquer avec votre équipe de soins de santé. Si vous n'êtes pas en mesure de joindre l'équipe pour obtenir des conseils, vous DEVEZ immédiatement obtenir une aide médicale d'urgence.</p>

Effets secondaires courants (25 à 49 personnes sur 100)	
Effet secondaire et mesure à prendre	Quand communiquer avec l'équipe de soins de santé
<p>Si vous faites de la fièvre :</p> <p>Si vous faites de la fièvre, essayez de communiquer avec votre équipe de soins de santé. Si vous n'êtes pas en mesure de joindre l'équipe pour obtenir des conseils, vous devez immédiatement obtenir une aide médicale d'urgence.</p>	
<p>Réaction allergique</p> <p>(Ces symptômes peuvent être graves)</p> <p>Quels signes sont à surveiller?</p> <ul style="list-style-type: none"> Des démangeaisons, une éruption cutanée, un gonflement des lèvres, du visage ou de la langue, serrement dans la poitrine ou dans la gorge. Cela peut survenir pendant ou peu de temps après que votre traitement vous a été administré, et peut être grave. <p>Que faire?</p> <ul style="list-style-type: none"> Informez immédiatement votre infirmière si vous ressentez des signes de réaction allergique pendant ou juste après votre traitement. Consultez votre équipe de soins de santé si vous présentez une légère réaction cutanée. 	<p>En cas de symptômes graves, obtenez immédiatement des soins médicaux d'urgence.</p>
<p>Fatigue</p> <p>Quels signes sont à surveiller?</p> <ul style="list-style-type: none"> Sensation de fatigue ou de manque d'énergie qui dure longtemps et ne s'atténue pas avec le repos ou le sommeil. <p>Que faire?</p> <ul style="list-style-type: none"> Soyez actif. Essayez de pratiquer 30 minutes d'activité physique modérée (vous devez réussir à parler confortablement pendant l'exercice) presque tous les jours. 	<p>Parlez-en à votre équipe de soins de santé si les symptômes sont intenses ou ne s'améliorent pas.</p>

Effets secondaires courants (25 à 49 personnes sur 100)	
Effet secondaire et mesure à prendre	Quand communiquer avec l'équipe de soins de santé
<ul style="list-style-type: none"> Consultez votre équipe de soins de santé avant de commencer une nouvelle activité physique. Prenez votre temps et évitez de vous presser. Repoussez les activités moins importantes. Reposez-vous quand vous en ressentez le besoin. Demandez à votre famille ou à vos amis de vous aider avec les tâches ménagères, le magasinage ou pour s'occuper des enfants et animaux de compagnie. Mangez bien et buvez au moins six à huit verres d'eau ou d'autres liquides chaque jour (sauf si votre équipe de soins de santé vous a recommandé d'en boire plus ou moins). Évitez de conduire ou d'utiliser des machines si vous êtes fatigué(e). <p>Pour obtenir de plus amples renseignements, demandez à votre équipe de soins de santé de vous fournir la brochure intitulée Fatigue.</p>	

Effets secondaires moins courants (10 à 24 personnes sur 100)	
Effet secondaire et mesure à prendre	Quand communiquer avec l'équipe de soins de santé
<p>Légères enflures</p> <p>Quels signes sont à surveiller?</p> <ul style="list-style-type: none"> Vous pouvez constater une légère enflure ou bouffissure au niveau des bras et des jambes. Dans de rares cas, ces symptômes peuvent être graves. <p>Que faire?</p> <p>Prévention des enflures :</p> <ul style="list-style-type: none"> Mangez des aliments peu salés. 	Parlez-en à votre équipe de soins de santé si les symptômes sont intenses ou ne s'améliorent pas.

Effets secondaires moins courants (10 à 24 personnes sur 100)	
Effet secondaire et mesure à prendre	Quand communiquer avec l'équipe de soins de santé
En cas d'enflures : <ul style="list-style-type: none"> Portez des vêtements amples. Pour les jambes et pieds enflés, élévez vos pieds quand vous êtes assis. 	
<p>Quantité insuffisante de sel dans votre corps (Ces symptômes peuvent être graves)</p> <p>Quels signes sont à surveiller?</p> <ul style="list-style-type: none"> Spasmes musculaires, crampes, faiblesse, contractions musculaires, ou convulsions. Battements de cœur irréguliers, confusion ou changements de tension artérielle. <p>Que faire?</p> <p>En cas de symptômes graves, obtenez immédiatement une aide médicale d'urgence.</p>	En cas de symptômes graves, obtenez immédiatement des soins médicaux d'urgence.
<p>Troubles hépatiques</p> <p>Votre équipe de soins de santé peut vérifier votre fonction hépatique à l'aide d'un test sanguin. Les changements hépatiques ne causent habituellement aucun symptôme.</p> <p>Quels signes sont à surveiller?</p> <ul style="list-style-type: none"> Dans de rares cas, vous pouvez constater un jaunissement de la peau ou des yeux, des urines inhabituellement sombres ou une douleur abdominale du côté droit. Ces signes peuvent être graves. <p>Que faire?</p> <p>En cas de symptômes de troubles hépatiques, obtenez une aide médicale d'urgence.</p>	Obtenez immédiatement une aide médicale d'urgence.

Effets secondaires moins courants (10 à 24 personnes sur 100)	
Effet secondaire et mesure à prendre	Quand communiquer avec l'équipe de soins de santé
<p>Niveaux bas d'albumine dans votre sang</p> <p>(Ces symptômes peuvent être graves)</p> <p>L'albumine est une protéine présente dans le sang. Cela aide à maintenir la pression dans les vaisseaux sanguins et à faire circuler des substances, comme les hormones et les médicaments, dans votre corps. Votre équipe de soins de santé peut vérifier vos niveaux d'albumine avec un test sanguin. Une faible teneur en albumine peut ne pas causer de symptômes à moins que votre taux soit très bas.</p> <p>Quels signes sont à surveiller?</p> <ul style="list-style-type: none"> • Fatigue (sensation de fatigue) • Faiblesse musculaire ou crampes • Perte d'appétit • Enflure dans vos chevilles ou jambes • Gonflement de votre ventre (si vous avez également des problèmes de foie) <p>Que faire?</p> <p>Si vous avez l'un de ces symptômes, parlez à votre équipe de soins de santé. Si vous avez des ballonnements au ventre, obtenez des soins médicaux d'urgence sans délai.</p>	<p>Si vous avez l'un de ces symptômes, parlez à votre équipe de soins de santé. Si vous avez des ballonnements au ventre, obtenez des soins médicaux d'urgence sans délai.</p>
<p>Étourdissements</p> <p>Quels signes sont à surveiller?</p> <ul style="list-style-type: none"> • Vous pourriez vous sentir étourdi ou sur le point de vous évanouir. <p>Que faire?</p> <ul style="list-style-type: none"> • Allongez-vous pour éviter de tomber. • Levez-vous et commencez à bouger doucement lorsque vous vous sentez mieux. • Ne conduisez pas et n'utilisez pas de machines si vous vous sentez étourdi. 	<p>Parlez-en à votre équipe de soins de santé si les symptômes sont intenses ou ne s'améliorent pas.</p>

Effets secondaires moins courants (10 à 24 personnes sur 100)	
Effet secondaire et mesure à prendre	Quand communiquer avec l'équipe de soins de santé
<p>Hypertension artérielle</p> <p>Quels signes sont à surveiller?</p> <ul style="list-style-type: none"> Il n'y a habituellement aucun signe d'hypertension artérielle. Rarement, il se peut que vous ayez des maux de tête, un essoufflement ou des saignements de nez. <p>Que faire?</p> <ul style="list-style-type: none"> Vérifiez régulièrement votre tension artérielle. Votre médecin peut prescrire des médicaments pour traiter l'hypertension artérielle. <p>Si vous présentez des maux de tête graves, obtenez immédiatement des soins médicaux d'urgence, car cela peut être un signe que votre pression artérielle est trop élevée.</p>	Parlez-en à votre équipe de soins de santé si les symptômes sont intenses ou ne s'améliorent pas.

D'autres effets secondaires rares mais graves sont possibles avec ce traitement.

Si vous rencontrez l'un des symptômes suivants, vous devez en parler à votre équipe de soins de santé contre le cancer ou recevoir immédiatement des soins médicaux d'urgence :

- nouvelle toux, problèmes respiratoires, douleur thoracique ou présence de sang dans la toux;
- de la douleur, un gonflement et un durcissement d'une veine de votre bras ou jambe;
- saignement des gencives, saignements de nez inhabituels, formation d'ecchymoses facilement ou plus que la normale, ou du sang dans votre urine ou vos selles. En cas de saignement très abondant ou qui ne s'arrête pas, vous devez obtenir une aide médicale d'urgence.

Pour de plus amples renseignements sur la façon de traiter vos symptômes, parlez-en à votre fournisseur de soins de santé, ou visitez: <https://www.cancercareontario.ca/fr/symptom-management>.

Remarques

December 2025 New information sheet (Nouvelle fiche d'information)

Les renseignements présentés dans les fiches d'information sur les médicaments, les fiches d'information sur les régimes et les renseignements à l'intention des patients pour le traitement des symptômes figurant dans le Formulaire pharmaceutique (le "Formulaire") ne sont offerts aux spécialistes de la santé et aux patients qu'à des fins d'information. Ces données ne visent pas à couvrir l'ensemble des utilisations, instructions, précautions, interactions médicamenteuses ou effets secondaires d'un médicament en particulier, et ne doivent pas servir à indiquer qu'une utilisation particulière d'un médicament est sans danger, approprié ou efficace pour un trouble de santé donné.

Les patients doivent toujours consulter un fournisseur de soins de santé s'ils ont des questions touchant l'information présentée dans le Formulaire. L'information du Formulaire ne vise pas à fournir ou remplacer une consultation médicale et ne doit pas servir à cette fin. L'utilisation du Formulaire doit être assujettie à une opinion clinique et les régimes prescrits peuvent ne pas concorder avec l'information du Formulaire.